


ЗАПИСКИ  
КАВКАЗСКАГО ОТДѢЛА  
ИМПЕРАТОРСКАГО  
РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.  
Книжка XXVIII, выпускъ 1-й.



К. А. Сатунинъ.


СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ КАТАЛОГЪ ПТИЦЪ  
Кавказскаго края.

Цѣна 40 копѣекъ.

ТИФЛИСЪ.

Типографія К. П. Козловскаго, Головинскій прощ., № 12. 9 м  
1911.





ЗАПИСКИ  
КАВКАЗСКАГО ОТДѢЛА  
ИМПЕРАТОРСКАГО  
РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.  
Книжка XXVIII, выпускъ 1-й.

---

К. А. Сатунинъ.

СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ КАТАЛОГЪ ПТИЦЪ  
Кавказскаго края.

п. 26639.

Цѣна 40 копѣекъ.

ТИФЛИСЬ.

Типографія К. П. Козловскаго, Головинскій промъ, № 12. 9  
1911.



ЗАПИСКИ

ПРАВОСЛАВНОГО СЛАВЯНОСЛОВИЩА  
И ПРАВОСЛАВНОГО  
ПРАВОСЛАВНОГО СЛАВЯНОСЛОВИЩА  
ПРАВОСЛАВНОГО СЛАВЯНОСЛОВИЩА

С. 1. 1. 1.

ПРАВОСЛАВНОГО СЛАВЯНОСЛОВИЩА

ПРАВОСЛАВНОГО СЛАВЯНОСЛОВИЩА

ПРАВОСЛАВНОГО СЛАВЯНОСЛОВИЩА

ПРАВОСЛАВНОГО СЛАВЯНОСЛОВИЩА

1101

1101

# СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ КАТАЛОГЪ ПТИЦЪ Кавказскаго края.

## I.

### Ordo Passeriformes.

Только крайняя необходимость заставила меня взяться за эту кропотливую, скучную работу, цѣль которой — сдѣлать полную сводку крайне разбросанной, по большей части малодоступной широкой публикѣ орнитологической литературы по Кавказу и дать полный перечень его птицъ, согласно съ требованіями современной систематики и номенклатуры.

Въ такомъ списокѣ ощущалась настоящая необходимость для каждаго, кто пожелалъ бы заняться зоогеографіей нашего края. Со времени изданія сочиненія Радде „Ornis Caucasica“ (1884 г.) прошло уже болѣе четверти столѣтія. За это время орнитологія ушла далеко впередъ, а сочиненіе Г. И. Радде и для своего времени было очень слабо, теперь же совершенно устарѣло, а другого сочиненія, охватывающаго весь нашъ край, не появлялось. Мое сочиненіе, напечатанное въ „Запискахъ“ нашего Отдѣла, хотя и касается болѣе или менѣе всего края, но содержитъ только мои личныя наблюденія, а не сводку многочисленныхъ работъ другихъ авторовъ, работавшихъ въ разныхъ частяхъ нашего обширнаго и разнообразнаго края. Я не задаюсь непосильною мнѣ задачей дать описаніе всѣхъ птицъ нашей фауны, а даю для каждой птицы лишь полную ея синонимику и указываю кратко ея географическое распространеніе.

Въ концѣ сочиненія я даю списокъ всей использованной мною литературы.

Чтобы показать, какъ возросло число извѣстныхъ на Кавказѣ видовъ птицъ, я ограничусь однимъ примѣромъ: Радде приводитъ изъ отряда воробьиныхъ птицъ (Passeriformes) 145 видовъ и разновидностей; въ настоящемъ каталогѣ ихъ уже 223, т. е. число ихъ увеличилось на 53 съ лишнимъ процента!

Въ поясненіе того, въ какомъ порядкѣ и какъ выполнилъ я мою программу, считаю нужнымъ сказать нѣсколько словъ. Представляемый въ настоящее время вниманію публики первый выпускъ содержитъ каталогъ отряда воробьиныхъ птицъ (*Passeriformes*), самаго многочисленнаго отряда, содержащаго почти половину всего извѣстнаго числа видовъ птицъ. Отрядъ этотъ для зоогеографіи имѣетъ наибольшее значеніе, ибо нигдѣ нѣтъ такъ много различныхъ мѣстныхъ географическихъ расъ, какъ именно у представителей этого отряда.

Въ общемъ я слѣдую системѣ, принятой въ новѣйшемъ сочиненіи о палеарктическихъ птицахъ Hartert'a: „Die Vögel der palaarktischen Fauna“. Послѣдній выпускъ 1-го тома этого сочиненія, заканчивающій *Passeriformes*, только что появился, а оно уже нуждается въ дополненіи, ибо за это время множество новыхъ формъ описано между прочимъ и съ Кавказа. Къ тому же, авторъ совершенно не зналъ русской литературы и очень плохой географъ, такъ что помѣщаетъ, напр., Батумъ на берега Каспійскаго моря. Поэтому даже къ этому капитальному сочиненію приходилось часто относиться критически. Я по возможности приводилъ номенклатуру, принятую Hartert'омъ, но съ нѣкоторыми его воззрѣніями рѣшительно не могу согласиться.

Чтобы избѣгнуть такого нежелательнаго явленія, какъ присвоеніе одной и той-же птицѣ различными авторами различныхъ названій, международные орнитологическіе и зоологическіе конгрессы установили права приоритета, по которымъ правильнымъ признавалось только то названіе, которое было дано животному при первомъ его описаніи.

Не совсѣмъ пришли къ соглашенію только въ вопросѣ, съ какого времени считать приоритетъ. Одни рѣшили съ X-го, другіе съ XII изданія классическаго труда Линнея „*Systema Naturae*“. Во всякомъ случаѣ, возстановленіе приоритета было задумано съ цѣлью избавить систематику животныхъ отъ царящей въ ней, вслѣдствіе произвольности названій, путаницы и привести къ единству номенклатуры.

Но, возстановляя приоритеты, нѣкоторые ученые увлеклись этимъ дѣломъ настолько, что совершенно упустили изъ виду ту цѣль, которой хотѣли достигнуть лица, признавшія права приоритета, и увлеклись отысканіемъ старинныхъ названій настолько, что стали вносить въ современную номенклатуру еще большую путаницу, извлекая изъ давно позабытыхъ сочиненій никому не-

вѣдомыя названія для замѣщенія общепринятыхъ и всѣмъ извѣстныхъ.

Поясню это на примѣрахъ.

Самымъ большимъ любителемъ приоритетовъ оказался Hartert.

Во всей Европѣ и Европ. Россіи имѣется два вида соловьевъ. Родовое названіе для соловья у разныхъ авторовъ было: *Lusciola*, *Luscinia*, *Erithacus*, *Daulias*, *Philomela* etc. Несомнѣнно, что нужно было принять то, которое имѣетъ приоритетъ, и Hartert показалъ, что таковымъ является *Luscinia*. Но въ названіи видовъ вовсе не было такого разнообразія, а всѣ называли западнаго соловья видовымъ именемъ „*lusciniæ*“, а восточнаго „*philomela*“.

Но Hartert доказалъ, что Линней зналъ только восточнаго соловья (другого въ Швеціи и нѣтъ!), а слѣдовательно, его и называлъ *lusciniæ*. Противъ этого ничего не возразишь, и приходится перемѣнить всѣми принятыя названія, ибо это вызывается необходимостью. Однако, есть случаи, въ которыхъ никакой необходимости нѣтъ.

Въ XII изданіи своей „*Systema Naturae*“ Линней называетъ пѣвчаго дрозда *Turdus musicus*, а дрозда-бѣлобровика — *Turdus iliacus*. Съ тѣхъ поръ, т. е. съ 1766 года и по сіе время, слѣдовательно въ теченіе 144 лѣтъ рѣшительно всѣ орнитологи употребляли для обозначенія этихъ дроздовъ только эти имена. Но вотъ Hartert раскопалъ, что въ X изданіи вышеупомянутаго сочиненія Линней называлъ *T. musicus* не пѣвчаго дрозда, а бѣлобровика, и теперь переноситъ на него названіе *T. musicus*, а для пѣвчаго дрозда предлагаетъ никому неизвѣстное названіе *T. philomelos*, данное старикомъ Брэмомъ одной изъ его мнимыхъ разновидностей.

Принятіе этого предложенія Hartert'a повлекло бы за собою ужасную путаницу и тамъ, гдѣ ея ранѣе не было.

Всѣ привыкли называть городскую ласточку *Chelidon urbica*, а деревенскую *Hirundo rustica*, а Hartert предлагаетъ называть первую *Hirundo urbica*, а вторую *Chelidon rustica*.

Я думаю, что „право давности“ съ успѣхомъ можетъ быть примѣнено и въ номенклатурѣ, и не мнѣню безъ особой необходимости названія, просуществовавшія уже болѣе 100 лѣтъ, особенно, если это грозитъ еще новой путаницей. Несогласенъ я съ Hartert'омъ и въ его стремленіи соединять многіе роды въ одинъ,

противъ чего возстали и многіе авторитетные орнитологи, напр., В. Л. Біанки.

Относительно самой техники изложенія я долженъ сказать, что былъ совершенно чуждъ научнаго педантизма, и, для экономіи мѣста, часто ставилъ въ одну рубрику названія съ различнымъ правописаніемъ, напр.: *Sitta Krueperi*, *Sitta Krüperi*, *Sitta krüperi*, а не дѣлалъ для каждаго названія особой рубрики, что значительно увеличило бы объемъ статьи.

Литература цитируется только начиная съ сочиненія М. Богданова „Птицы Кавказа“, такъ какъ сводка болѣе старой уже имѣется въ этомъ сочиненіи.

Цитирую я только научную литературу, а множество мелкихъ статей, разсыянныхъ въ популярныхъ, особенно охотничьихъ журналахъ, опускаю и цитирую только въ случаѣ настоятельной необходимости, напр., когда о нахожденіи даннаго вида говорится только въ этой статьѣ.

Тифлисъ.

7 сентября 1910 г.

К. А. Сатунинъ.

ПРИНЯТЫЯ ВЪ НАСТОЯЩЕМЪ КАТАЛОГѢ СОКРАЩЕНІЯ ЗАГЛАВІЙ ГЛАВНѢЙШИХЪ ЦИТИРУЕМЫХЪ СОЧИНЕНІЙ.

Билькевичъ, Дагестанъ.—Ст. Билькевичъ. Матеріалы къ изслѣдованію орнитологической фауны Дагестана. Приложение къ Протокол. Засѣд. Общ. Естествоиспытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ, № 136. Казань, 1893.

Богдановъ, Пт. Кавк.—Модестъ Богдановъ. Птицы Кавказа. Труды Общ. Естествоисп. при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ, т. VIII, вып. 4. Казань, 1879.

Бутурлинь, Сборы Кобылина.—С. Бутурлинь. Птицы Закавказья по сборамъ А. М. Кобылина. Тула, 1906.

Вильконскій, Аджарія.—Вильконскій Ф. В. Орнитологическая фауна Аджаріи, Гуріи и сѣверо-восточной части Лазистана. Матеріалы къ познанію флоры и фауны Россійской Имперіи, отд. зоол. гич., вып. III, 1896.

Catal.—Museum Caucasicum. I. Коллекція Кавказскаго Музея, обработанная совместно съ учеными специалистами и изданная Др. Г. И. Радде. 1899.

Дерюгинъ, Чорохск. кр.—К. М. Дерюгинъ. Матеріалы по орнитофаунѣ Чорохскаго края (юго-западное Закавказье) и окрестностей Трапезонды. Ежегодникъ Зоологическ. Музея Императорской Академіи Наукъ, т. V, 1900.

Динникъ, Орн. набл.—Н. Динникъ. Орнитологическія наблюденія на Кавказѣ. Труды Императорскаго С.-Петербургскаго Общества Естествоиспыт., т. XVII, 1886.

Hartert.—Ernst Hartert. Die Vögel der paläarktischen Fauna. Systematische Übersicht der in Europa, Nord-Asien und Mittelmeerregion vorkommenden Vögel. Bd. I. Berlin, 1903—1910.

Кобылинъ, Интересныя находки.—А. М. Кобылинъ. Интересныя орнитологическія находки на Кавказѣ. Извѣст. Кавказск. Музея, т. III, 1907.

Кобылинъ, Матеріалы.—А. М. Кобылинъ. Матеріалы для орнитофауны Кавказскаго края. Т. Кутаисская губернія. Извѣст. Кавк. Музея, т. III, 1908.

Lorenz, Beitrag.—Th. Lorenz. Beitrag zur Kenntniss der Ornithologischen Fauna an der Nordseite des Kaukasus. Moskau, 1887.

Loudon, Reise.—Harald Baron Loudon. Meine dritte Reise nach Central-Asien und ihre ornithologische Ausbeute (Abdruck aus Journ. f. Ornith., 1909, S. 605—573 und 1910, S. 1—90).

Мензбиръ, Пт. Росс.—М. А. Мензбиръ. Птицы Россіи. 2 тома, Москва, 1893—1895.

Радде, Orn. Caucas.—Радде. Орнитологическая фауна Кавказа (Ornis Caucasica). Систематическое и біолого-географическое описаніе кавказскихъ птицъ. Тифлисъ, 1884.

Radde, Talysch.—G. Radde. Fauna und Flora des Südwestlichen Caspi-Gebietes. Leipz., 1886.

Россиковъ, Дол. Малки.—Константинъ Россиковъ. Обзоръ зимней фауны птицъ восточной части долины р. Малки. Прилож. къ XLIX-му тому Записокъ Императорской Академіи Наукъ, № 4. С.-Петербургъ, 1884.

Россиковъ, СВ. Кавк.—К. Н. Россиковъ. Результаты наблюденій надъ птицами западной части сѣверо-восточнаго Кавказа. Труды Императорскаго С.-Петербургск. Общ. Естествоисп., т. XIX, отд. Зоолог. и Физиологіи, 1888.

Сатуниинъ, Распространеніе.—К. А. Сатуниинъ. О распространеніи нѣкоторыхъ птицъ въ Закавказьѣ. „Природа и Охота“, кн. I, 1899.

Сатуниинъ, Матеріалы.—К. А. Сатуниинъ. Матеріалы къ познанію птицъ Кавказскаго края. Зап. Кавк. Отд. Императорскаго Русск. Географич. Общества, т. XXVI, вып. 3, 1907.

Цвѣтковъ.—Е. В. Цвѣтковъ. Орнитологическія наблюденія въ окрестностяхъ Бѣлаго Ключа. Матеріалы къ познанію фауны и флоры Россійской Имперіи. Отд. зоологическ., вып. V. Москва, 1901.

## Ordo Passeriformes.

### Familia Corvidae.

Genus *Corvus* L. 1758.

#### 1. *Corvus corax corax*. Воронъ.

*Corvus Corax* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 105 (1758).

*Corvus corax* L. Богдановъ, Пт. Кавк., стр. 52; Радде, *Ornis Caucas.*, стр. 94; Id., *Talysch*, 14; Россиковъ, Дол. Малки, стр. 32; Динникъ, Орн. набл., стр. 329; Lorenz, *Beitrag*, p. 7; Мензбиръ, Пт. Росс., II, стр. 457; Вильконскій, Аджарія, стр. 91; Цвѣтковъ, стр. 80; *Catal.*, 189; Кобылинъ, Матеріалы, стр. 50; Сатунинъ, Матеріалы, стр. 3; Hartert, I, p. 2; Loudon, *Reise*, 52.

*Corvus corvus* Дерюгинъ, Чорохскій кр., стр. 6.

Въ горахъ, многочисленнѣе въ западномъ Закавказьѣ. На низменностяхъ лишь случайно зимою.

Кавказскій воронъ мельче типичнаго и не отдѣленъ пока въ особый подвидъ только по недостатку матеріала.

#### 2. *Corvus cornix* L. Сѣрая ворона.

*Corvus Cornix* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 105 (1758).

*Corvus cornix* L. Богдановъ, Пт. Кавк., 53; Радде, *Ornis Caucas.*, 96; Id., *Talysch*, 14; Россиковъ, Дол. Малки, 20; Динникъ, Орн. набл., 329; Lorenz, *Beitrag*, 7; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 469; Цвѣтковъ, 80; *Catal.*, 189; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 6; Сатунинъ, Матеріалы, 3; Кобылинъ, Матеріалы, 50; Loudon, *Reise*, 51.

*Corvus cornix cornix* Hartert, I, 9.

Обыкновенна всюду.

3. *Corvus cornix sharpei* Oates. Туркестанская сѣрая ворона.

*Corvus sharpei* Oates, Fauna Brit. India, Birds, I, p. 20 (1889).

*Corvus cornix sharpii* Hartert, I, 10; Бутурлинъ, Орн. Вѣстн., I, 144 (1910).

Найдена въ Арешскомъ уѣздѣ Елисаветпольской губ. Является ли здѣсь эта форма только заметною, или замѣняющею предыдущую, пока еще не выяснено.

4. *Corvus corone corone* L. Черная ворона.

*Corvus Corone* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 105 (1758).

*Corvus corone* L., Богдановъ, Пт. Кавк., 53; Радде, Orn. Caucas., 95; Россиковъ, Дол. Малки, 32; Динникъ, Орн. набл., 331; Сатунинъ, Матеріалы, 4; Catal., 189.

*Corvus corone corone* Hartert, 11.

На Кавказѣ преимущественно пролетная и зимующая; птица. Въ верхней части долины р. Куры (Сурамская равнина) гнѣздится (по Радде). Приводимыя М. Богдановымъ свѣдѣнія о нахожденіи черной вороны на Сѣверномъ Кавказѣ на большихъ высотахъ требуютъ провѣрки.

5. *Corvus frugilegus frugilegus* L. Грачъ.

*Corvus frugilegus* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 105 (1758).

*Truanocorax frugilegus* Богдановъ, Пт. Кавк., 54; Россиковъ, Дол. Малки, 20; Динникъ, Орн. набл., 330; Сатунинъ, Матеріалы, 4.

*Corvus frugilegus* Радде, Orn. Caucas., 98; Id., Talysh, 14; Lorenz, Beitrag, 7; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 462 Вильконскій, Аджарія, 91; Цвѣтковъ, 80; Catal., 189; Кобылинъ, Матеріалы, 50; Loudon, Reise, 52.

*Corvus frugilegus frugilegus* Hartert, I, 13.

Грачъ многочисленъ только на низменностяхъ по долинамъ рѣкъ; въ горахъ до 4000'.

**Coloeus** Каур. 1829.

6. *Coloeus monedula collaris* Drummond. Галка.

*Corvus collaris* Drummond, Ann. et Mag. Nat. Hist., XVIII, p. 11 (1846).

*Lucos monedula* Богдановъ, Пт. Кавк., 54; Россиковъ, Дол. Малки, 21; Динникъ, Орн. набл., 331.

*Corvus monedula* Радде, Orn. Caucas., 98; Id., Talysch, 14; Lorenz, Beitrag, 7; Вильконскій, Аджарія, 92; Цвѣтковъ, 80; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 8; Кобылинъ, Матеріалы, 51.

*Corvus monedula et collaris* Catal., 189; Loudon, Reise, 90.

*Corvus monedula collaris* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 477.

*Coloeus monedula collaris* Hartert, I, 17; Сатунинъ, Матеріалы, 5.

Какъ гвѣздающаяся птица извѣстна только для Сѣвернаго Кавказа (Динникъ) и восточнаго Закавказья (Сатунинъ). Зимую встрѣчается и въ другихъ мѣстахъ, на низменности.

**Pica** Vieill 1816.

7. *Pica pica pica* L. Сорока обыкновенная.

*Corvus Pica* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 106 (1758).

*Pica eugoraea* Богдановъ, Пт. Кавк., 55; Россиковъ, Дол. Малки, 22; Динникъ, Орн. набл., 330.

*Pica caudata* Радде, Orn. Caucas., 100; Id., Talysch, 14; Lorenz, Beitrag, 7; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 483; Цвѣтковъ, 80; Catal., 190.

*Pica pica* Дерюгинъ, Чорохск. кр., 8; Сатунинъ, Матеріалы, 5.

*Pica rustica* Loudon, Reise, 54.

*Pica pica pica* Hartert, I, 19.

Весь край до 6500'.

8. *Pica pica bactriana* Вр. Бѣлкрылая сойка.

*Pica bactriana* Bonaparte, *Consp. Av.*, I, p. 383 (1850).

*Pica leucoptera* Мензбиръ, *Пт. Росс.*, II, 487; London, *Reise*, 54.

*Pica caudata* (partim!) Radde, *Talysch*, 14.

По Бутурлину, встрѣчается также повсюду, гдѣ встрѣчается и типичная форма.

*Garrulus Vieill* (Ex Brisson) 1816.9. *Garrulus glandarius krynicki* Kalenicz. Кавказская сойка.

*Garrulus Krynicki* Kaleniczenko, *Bull. Soc. Mosc.* XII, p. 319, *Taf.* 9 (1839).

*Garrulus Krynickii* Богдановъ, *Пт. Кавк.*, 56; Росиковъ, *Дол. Малки*, 22; Динникъ, *Орн. набл.*, 332; Lorenz, *Beitrag*, 8; Билькевичъ, *Дагестанъ*, 17; Мензбиръ, *Пт. Росс.*, II, 497; Вильконскій, *Аджарія*, 92; Цвѣтковъ, 81; Бутурлинь, *Сборы Кобылина*, 15; Кобылинъ, *Материалы*, 51.

*Garrulus glandarius* var. *Krynickii* Радде, *Ornis Caucas.*, 102; Id., *Talysch*, 14.

*Garrulus glandarius krynicki* Hartert, I, 32.

*Garrulus garrulus Krynicki* Сатунинъ, *Материалы*, 6.

*Garrulus garrulus Anatoliae* Сатунинъ, *ibid.*, 7.

*Garrulus melanoccephalus* var. *anatoliae* Дерюгинъ, *Чорохск. кр.*, 6.

Весь Кавказскій край за исключеніемъ Талыша

10. *Garrulus glandarius caspius* Seeb. Каспійская сойка.

*Garrulus atricapillus* subsp. *caspius* Seeböhm, *Ibis*, 1883, p. 8.

*Garrulus glandarius* var. *hyrcanus* (partim!) Радде, *Ornis Caucas.*, 102; Id., *Talysch*, 14.

*Garrulus garrulus caspius* Сатунинъ, *Материалы*, 7.

*Garrulus glandarius caspius* Hartert, I, 31.

*Garrulus caspius* Бутурлинь, *Сборы Кобылина*, 17; London, *Reise*, 53.

*Garrulus glandarius interm. hyrcanus et hyrcanus (partim!)* Catal., 191.

Талышинская низменность.

11. *Garrulus glandarius hyrcanus* Blanf. Талышинская сойка.

*Garrulus hyrcanus* Blanford, Ibis, 1873, p. 225.

*Garrulus glandarius* var. *hyrcanus* (partim!) Радде, Orn. Caucas., 102; Id., Talysch, 14.

*Garrulus garrulus hyrcanus* Сатунинъ, Материалы, 7.

*Garrulus glandarius hyrcanus* Hartert, I, 31; Catal., 191.

Талышинскія горы.

*Pyrrhocorax Vieill* 1816.

12. *Pyrrhocorax pyrrhocorax* L. Клушица.

Урпа *Pyrrhocorax* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 118 (1758).

*Fregilus graculus* Богдановъ, Пт. Кавк., 55; Радде, Orn. Caucas., 100; Id., Talysch, 14; Динникъ, Орн. набл., 331; Lorenz, Beitrag, 8; Билькевичъ, Дагестанъ, 17; Catal., 190.

*Pyrrhocorax graculus* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 507; Сатунинъ, Материалы, 7.

*Graculus graculus* Дерюгинъ, Хорохск. кр., 6.

*Pyrrhocorax pyrrhocorax* Hartert, I, 35.

Альпійская область всего Кавказа и Закавказья (6—12000').

13. *Pyrrhocorax graculus* L. Альпійская галка.

*Corvus Graculus* Linné, Syst. Nat. Ed. XII, p. 158 (1766).

*Pyrrhocorax alpinus* Богдановъ, Пт. Кавк., 56; Радде, Orn. Caucas., 99; Динникъ, Орн. набл., 332; Lorenz, Beitrag, 8; Россиковъ, СВ. Кавк., 55; Билькевичъ, Дагестанъ, 17; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 511; Сатунинъ, Материалы, 7; Catal., 190.

*Pyrrhocorax graculus* Hartert, I, 36.

То же распространение, но встрѣчается значительно рѣже.

### Fam. Sturnidae.

#### *Sturnus* L. 1758:

14. *Sturnus vulgaris vulgaris* L. Обыкновенный скворецъ.

*Sturnus vulgaris* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 167 (1758).

*Sturnus vulgaris* Lorenz, Beitr. 9; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 519; Сатунинъ, Матеріалы, 9; Catal., 186.

Примѣч. Остальные авторы подъ именемъ *St. vulgaris* приводили другія формы.

Въ Закавказьѣ встрѣчается какъ зимующая и пролетная птица.

15. *Sturnus vulgaris caucasicus* Lorenz. Кавказскій скворецъ.

*Sturnus caucasicus* Lorenz, Beitr. Orn. Faun. Caucas., p. 9, Taf. V, f. 1 (1887).

*Sturnus caucasicus* Мензбиръ, Пт. Росс., 519; Цвѣтковъ, 81; Сатунинъ, Матеріалы, 8; Catal., 187.

*Sturnus vulgaris caucasicus* Hartert, I, 46.

*Sturnus vulgaris cum variet. plur.* Радде, Orn. Caucas., 115; Id., Talysch, 15\*.

*Sturnus poltoratzkii* Kaukasicus London, Reise, 49.

Сѣверный Кавказъ и восточное Закавказье.

16. *Sturnus vulgaris poltoratskyi* Finsch. Сибирскій скворецъ.

*Sturnus poltoratskyi* Finsch, Proc. Zool. Soc., 1878, p. 712.

---

\* Къ этому скворцу, во всякомъ случаѣ, относится часть показаній Радде; при другихъ же я болѣе не цитирую этихъ сочиненій Радде, ибо совершенно невозможно догадаться, о какой именно формѣ онъ говоритъ.

*Sturnus Poltoratzkyi* Сатуинъ, Матеріалы, 9; London, Reise, 49.

*Sturnus vulgaris poltoratskyi* Hartert, I, 44; Catal., 187.

Центральная часть Закавказья.

17. *Sturnus vulgaris satunini* Buturlin.

*Sturnus poltoratzkyi satunini* Buturlin, Ornith. Jahrb., XV, 1904, p. 207.

*Sturnus Poltoratzkyi Satunini* Сатуинъ, Матеріалы, 9; London, Reise, 49.

Описанъ съ Сѣвернаго Кавказа (Кисловодскъ), но, повидимому, встрѣчается и въ Закавказьѣ.

18. *Sturnus vulgaris purpurascens* Gould. Пурпуровый скворецъ.

*Sturnus purpurascens* Gould, Proc. Zool. Soc. London, 1868, p. 219.

*Sturnus purpurascens* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 519; Кобылинъ, Матеріалы, 49; London, Reise, 50.

*Sturnus vulgaris purpurascens* Hartert, I, 46.

*Sturnus caucasicus* Вильконскій, Аджарія, 92.

? *Sturnus nitens* Богдановъ, Пт. Кавк., 58.

Гѣльская котловина и, вѣроятно, все нагорье Карсской области и западное Закавказье.

19. *Sturnus vulgaris tauricus* Buturlin. Крымскій скворецъ.

*Sturnus tauricus* Buturlin, Ornithol. Jahrb., XV, 1904, p. 209.

*Sturnus purpurascens* Lorenz, Beitrag, 9; Сатуинъ, Матеріалы, 10; Catal., 186.

Сѣверо-западная часть Предкавказья.

20. *Sturnus vulgaris menzbieri* Sharpe.

*Sturnus menzbieri* Sharpe, Ibis, 1888, p. 438.

*Sturnus menzbieri* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 519.

*Sturnus Menzbieri* Сатуниъ, Матеріалы, 9; Catal., 186.

*Sturnus poltoratzkyi menzbiri* Loudon, Reise, 49.

Встрѣчается среди другихъ зимующихъ скворцовъ въ Закавказьѣ. Hartert соединяетъ его съ *St. v. poltoratzkyi*. Если это справедливо, то скворецъ, гнѣздящійся въ центральномъ Закавказьѣ и извѣстный у русскихъ орнитологовъ подъ именемъ *St. poltoratskyi*, представляетъ новую форму.

С. А. Бутурлинъ отвергаетъ гнѣздование *St. poltoratskyi* въ Закавказьѣ.

#### 21. *Sturnus vulgaris intermedius* Praz.

*Sturnus poltoratzkyi intermedius* Кобылинъ, Матеріалы, 48.

*Sturnus vulgaris intermedius* Loudon, Reise, 49.

Западное Закавказье (Кутаисская губ.). Зимую, какъ это видно изъ цитируемой литературы, большинство перечисленныхъ формъ встрѣчается на изменностяхъ восточнаго Закавказья.

#### 22. *Sturnus vulgaris jitkowi* But. Заволжскій скворецъ.

*Sturnus vulgaris jitkowi* Buturlin, Ornithol. Jahrb., XV, 1904, p. 206.

Встрѣчается только зимою какъ на Сѣверномъ Кавказѣ, такъ и въ Закавказьѣ.

Приведенная здѣсь мною систематика скворцовъ изложена по Hartert'у, но она, несомнѣнно, искусственна и не натуральна. Уже во время печатанія этой статьи, я получилъ свѣдѣніе, что и Hartert, и Бутурлинъ признаютъ существоющую группировку видовъ рода *Sturnus* неправильною и намѣрены совершенно переработать систематику представителей этого рода.

**Pastor** Temm. 1815.**23. Pastor roseus L.** Розовый скворецъ.

*Turdus roseus* Linné, *Syst. Nat.* Ed. X, p. 170 (1758).

*Pastor roseus* Богдановъ, Пт. Кавк., 59; Радде, *Ornis Caucas.*, 119; Id., *Talysch*, 15; Динникъ, Орн. набл., 333; Lorenz, *Beitrag*, 11; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 512; Вильконскій, Аджарія, 92; *Catal.*, 185; Цвѣтковъ, 81; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 9; Сатуниинъ, Матеріалы, 10; Hartert, I, 47.

По всему краю отъ уровня моря до 7500'. Старинное указаніе Нордманна \* о зимованіи розоваго скворца въ западномъ Закавказьѣ, опровергаемое Радде, подтверждается появленіемъ среди зимы стай этихъ птицъ въ нижней части долины Чороха (с. Марадиди).

**Fam. Oriolidae.****Oriolus** Linné 1766.**24. Oriolus galbula galbula L.** Иволга.

*Oriolus galbula* Linné, *Syst. Nat.* Ed. XII, p. 160 (1766).

*Coracias Oriolus* Linné, *Syst. Nat.* Ed. X, p. 107 (1758).

*Oriolus galbula* Богдановъ, Пт. Кавк., 82; Радде, *Ornis Caucas.*, 120; Id., *Talysch*, 15; Динникъ, Орн. набл., 343; Lorenz, *Beitrag*, 40; Вилькевичъ, Дагестанъ, 13; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 735; Вильконскій, Аджарія, 106; *Catal.*, 158; Цвѣтковъ, 88; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 9; Сатуниинъ, Матеріалы, 11; Кобылинъ, Матеріалы, 49.

*Oriolus oriolus oriolus* Hartert, I, 51.

---

\* Nordmann, Al. *Observations sur la faune pontique. Voyage dans la Russie meridionale et la Crimée, etc.*, executé en 1837, sous la direction de M. Anatole Demidoff. Paris. T. III, p. 123 (1840).

Весь край, 0—6500'. Самое высокое мѣстонахождение на гѣздовѣ около 7000' близъ сел. Коды, Ардаганск. окр. Карсской области.

### Fam. Fringillidae.

#### *Coccothraustes* Pallas 1811.

##### 25. *Coccothraustes coccothraustes coccothraustes* L. Дубоносъ.

*Loxia coccothraustes* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 171 (1758).

*Coccothraustes vulgaris* Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat., II, 12 (1811); Богдановъ, Пт. Кавк., 62 (sine synon.); Динникъ, Орн. набл., 322; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 657; Catal., 174 (№ 187, r, u, w).

*Coccothraustes coccothraustes coccothraustes* Hartert, I, 55.

Пока еще не выяснено, принадлежит ли къ этой типичной формѣ дубоносъ, гнѣздящійся на Сѣверномъ Кавказѣ. Во всякомъ случаѣ, эта форма встрѣчается у насъ на пролетѣ и, можетъ быть, на зимовѣ.

##### 26. *Coccothraustes coccothraustes nigricans* But. Кавказскій дубоносъ.

*Coccothraustes nigricans* Бутурлинъ, Наша Охота, 1908, IX, 67.

*Coccothraustes vulgaris* Радде, Orn. Caucas., 141; Id., Talysch, 16; Вильконскій, Аджарія, 99; Цвѣтковъ, 85; Сатунинъ, Матеріалы, 12; ? Кобылинъ, Матеріалы, 47; Catal., 174.

Лѣсная полоса центрального и восточнаго Закавказья до 4000'.

#### *Chloris* Cuv. 1800.

##### 27. *Chloris chloris chloris* L. Зеленушка.

*Loxia Chloris* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 174 (1758).

*Chlorospica chloris subsp. chlorotica*, Богдановъ, Пт. Кавк., 62.

*Chlorospiza chloris* Радде, *Ornis Caucas.*, 139; Id., *Talysch*, 16; Динникъ, Орн. набл., 323; Lorenz, *Beitrag*, 12; Россиковъ, Св. Кавк., 47 и 52; Вильконскій, Аджарія, 98; Сатунинъ, Матеріалы, 12.

*Chloris chloris* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 661; Цвѣтковъ, 85; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 10; Кобылинъ, Матеріалы, 47.

*Ligurinus chloris* Loudon, *Reise*, 44; *Catal.*, 175.

*Ligurinus chlorotica* *Catal.*, 175 (№ 188, v, w.).

По всему краю, но многочисленнѣе по черноморскому побережью.

### *Carduelis* Briss. 1760.

28. *Carduelis carduelis carduelis* L. Щеголь.

*Fringilla Carduelis* Linné, *Syst. Nat. Ed. X*, p. 180. (1758).

*Carduelis elegans* Богдановъ, Пт. Кавк., 63 (partim); Россиковъ, Дол. Малки, 23; Динникъ, Орн. набл., 322; Lorenz, *Beitr.*, 12; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 651.

*Carduelis carduelis* Сатунинъ, Матеріалы, 13.

*Carduelis carduelis carduelis* Hartert, I, 67.

Типичная форма, можетъ быть, гнѣздится на Сѣверномъ Кавказѣ, въ Закавказьѣ же встрѣчается только зимою.

29. *Carduelis carduelis brevirostris* Zarudny.

*Carduelis elegans brevirostris* Zarudnoy, *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, 1889, p. 133 (1890).

*Carduelis elegans* Радде, *Ornis Caucas.*, 133; Id., *Talysch*, 15 (partim); Вильконскій, Аджарія, 97; Цвѣтковъ, 85; *Catal.*, 178.

*Carduelis carduelis minor* Дерюгинъ, Чорохск. кр., 11; Loudon, *Reise*, 44.

*Carduelis carduelis brevirostris* Бутурлинъ, Сборъ Кобылина, 13; Сатунинъ, Матеріалы, 13; Кобылинъ, Матеріалы, 46; Hartert, I, 70.

Это гнѣздящаяся форма Закавказья, 0—7000'.

30. *Carduelis carduelis loudoni* Zar. Персидский щеголь.

*Carduelis carduelis loudoni* Zarudny, Ornith. Monatsber., 1906, p. 48.

*Carduelis carduelis loudoni* Бутурлинъ, Наша Охота, 1908.

? *Carduelis elegans* Radde, Talysch, 15.

Талышъ, а, можетъ быть, и все каспійское побережье Закавказья.

31. *Carduelis carduelis volgensis* But. Восточно-русский щеголь.

*Carduelis carduelis volgensis* Buturlin, Ibis, 1906, VII, p. 424.

*Carduelis carduelis volgensis* Бутурлинъ, Наша Охота, 1908, 3; Loudon, Reise, 44.

Только зимою.

*Chrysomitris* Boie 1828.32. *Chrysomitris spinus* L. Чижъ.

*Fringilla spinus* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 181 (1758).

*Chrysomitris spinus* Богдановъ, Пт. Кавк., 64; Радде, Ornith. Caucas., 138; Id., Talysch, 16; Lorenz, Beitrag, 13; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 646; Вильконскій, Аджарія, 97; Цвѣтковъ, 84; Catal., 178; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 10; Сатунинъ, Матеріалы, 13.

*Fringilla spinus* Россиковъ, Сб. Кавк., 52 и 53.

*Acanthis spinus* Hartert, I, 71.

Верхній лѣсной поясъ всего края.

*Acanthis* Bechstein 1803.33. *Acanthis cannabina cannabina* L. Рѣполовъ.

*Fringilla cannabina* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 182 (1758).

*Linota cannabina*? Богдановъ, Пт. Кавк., 66; Росси-  
ковъ, Дол. Малки, 34; Lorenz, Beitrag, 14; Россиковъ, Зап. Кавк.,  
46; Вильконскій, Аджарія, 98; Loudon, Reise, 43.

*Linota cannabina* L. typ. Радде, Ornith. Caucas., 131;  
Id., Talysch, 15; Catal., 179.

*Acanthis cannabina* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 613;  
Сатунинъ, Матеріалы, 14.

Зимою встрѣчается всюду. Гнѣздится ли на Сѣверномъ  
Кавказѣ, еще не выяснено.

#### 34. *Acanthis cannabina fringillirostris* Bp. & Schleg.

*Linota fringillirostris* Bonaparte & Schlegel,  
Monogr. Loxiens, p. 45, Taf. 49 (1850).

*Linota bella* Богдановъ, Пт. Кавк., 65; Динникъ, Орн.  
набл., 323; Radde, Talysch, 15; Catal., 179.

*Linota cannabina fringillirostris* Радде, Ornith.  
Caucas., 131.

*Acanthis fringillirostris* Мензбиръ, Пт. Росс., II,  
617; Цвѣтковъ, 83; Сатунинъ, Матеріалы, 14.

*Acanthis cannabina fringillirostris* Hartert,  
I, 75.

Осѣдлая птица всего Кавказскаго края.

Бутурлинъ считаетъ *A. s. fringillirostris* птицею Цент-  
ральной Азіи; но проф. Мензбиръ и, въ послѣднее время,  
Hartert указываютъ ее именно для Кавказа и Передней Азіи  
(Туркестанъ, Персія, Афганистанъ, до сѣв. Кашмира). Я не  
берусь рѣшать, кто правъ, но категорически долженъ за-  
явить, что всѣ рѣполовы, встрѣченные мною на гнѣздовьяхъ  
въ восточномъ Закавказьѣ, не принадлежали къ формѣ *A. s.*  
*cannabina*, какъ думаетъ Бутурлинъ, а рѣзко отличались отъ  
нея. Какъ правильнѣе называть эту форму, пусть рѣшаютъ  
спеціалисты-орнитологи.

#### 35. *Acanthis flavirostris brevirostris* Moore.

*Linota brevirostris* Moore, Proc. Zool. Soc.  
London, 1855, p. 216.

*Linota brevirostris* Богдановъ, Пт. Кавк., 66; Lorenz, Beitr., 14.

*Linota brevirostris* et *L. flavirostris* Радде, Orn. Caucas., 133.

*Acanthis brevirostris* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 606; Сатунинъ, Материалы, 14.

*Acanthis flavirostris brevirostris* Hartert, I, 77.

Зимующая птица нашего края.

### 36. *Acanthis linaria linaria* L. Чечотка.

*Fringilla Linaria* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 182 (1758).

*Acanthis linaria* Богдановъ, Пт. Кавк., 67; Lorenz, Beitr., 15; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 607.

*Linota linaria* Россиковъ, Зап. Кавк., 47; Catal., 180.

*Acanthis flammea flammea* L. Hartert, I, 77.

Встрѣчается зимою на Сѣверномъ Кавказѣ.

### *Oraegithus* Homeyer 1880.

#### 37. *Oraegithus pusillus* Pall. Корольковый вьюрокъ.

*Passer pusillus* Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat., II, p. 28, Taf. XLIII, fig. 1 (1811).

*Oraegithus pusillus* Богдановъ, Пт. Кавк., 64; Lorenz, Beitr., 13; Россиковъ, СВ. Кавк., 53; Сатунинъ, Материалы, 14.

*Metoronia pusilla* Радде, Orn. Caucas., 137; Id., Talysch, 16; Билькевичъ, Дагестанъ, 14.

*Serinus pusillus* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 644; Catal., 180; Цвѣтковъ, 84; Hartert, I, 85.

Повсемѣстно съ 5000' до альпійской области; зимою спускается ниже.

### *Serinus* Koch 1816.

#### 38. *Serinus canarius serinus* L. Канареечный вьюрокъ.

*Fringilla Serinus* Linné, Syst. Nat. Ed. XII, p. 320 (1766).

*Serinus hortulanus* Мензбирь, Пт. Росс., II, 641; Сатунинь, Охотн. Газета, 1896, стр. 218; Catal., 180.

*Serinus canaria serinus* Hartert, I, 83; Сатунинь, Материалы, 16.

Пока извѣстенъ только единичный случай залета стайки этихъ птичекъ въ Тифлисъ весною 1896 года (Сатунинь).

### *Rhodopechys* Cab. 1850.

39. *Rhodopechys sanguinea* Gould. Краснокрылый чечевичникъ.

*Eringilla sanguinea* Gould, Proc. Zool. Soc. London, 1837, p. 127.

*Erythrospiza rhodoptera* Радде, Orn. Caucas., 130; Id. Talysch, 15; Lorenz, Beitrag, 17; Catal., 173.

*Rhodopechys sanguinea* Мензбирь, Пт. Росс., II, 603; Hartert, I, 90.

Изрѣдка залетаетъ зимою въ Закавказье (Ленкоранск. уѣздъ) и на Сѣверный Кавказъ (дол. Кичъ-Малки, Кубанск. обл.).

### *Pyrrhula* Pallas 1811.

40. *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula* L. Снѣгирь.

*Loxia Pyrrhula* Linne, Syst. Nat. Ed. X, p. 171 (1758).

*Pyrrhula vulgaris*? Россиковъ, Дол. Малки, 34; Динвикъ, Орнит. набл., 324.

*Pyrrhula soccinea* Мензбирь, Пт. Росс., II, 589.

Несмотря на возраженія г. Бутурлина, я по-прежнему думаю, что этотъ снѣгирь, вѣроятно, залетаетъ зимою въ степи Сѣвернаго Кавказа, такъ какъ птица эта зимою предпринимаетъ дальнія перекочевки.

41. *Pyrrhula pyrrhula rossikowi* Derjugin. Кавказскій снѣгирь.

*Pyrrhula pyrrhula rossikowi* Derjugin, Ann. Mus. Zool. Acad. Imp. Sc. Pétersb., V, p. 285 (1900).

*Pyrrhula vulgaris* Богдановъ, Пт. Кавк., 68; Мензбиръ, Пт. Росс., II, p. 592; Россиковъ, СВ. Кавк., 54; Вильконскій, Аджарія, 96; Цвѣтковъ, 83.

*Pyrrhula pyrrhula rossikowi* Дерюгинъ, Чорохск. кр., 9; Бутурлинъ, Сборъ Кобылина, 10; Сатунинъ, Матеріалы, 16; Кобылинъ, Матеріалы, 48; Hartert, I, Nachträge.

*Pyrrhula rubicilla* cum var. major, minor, coccinea Cassini Радде, Orn. Caucas., 141; Catal., 172.

*Pyrrhula rubicilla* var. major Radde, Talysch, 16.

Гнѣздящаяся форма всего края. До 7500'.

#### 42. *Pyrrhula pyrrhula caspica* With. Каспійскій снѣгирь.

*Pyrrhula pyrrhula caspica* Witherby, Bull. Br. Ornith. Club, 16 Dec. 1908.

*Pyrrhula pyrrhula caspica* Бутурлинъ, Наша Охота, 1909, 76.

? *Pyrrhula rubicilla* var. minor Radde, Talysch, 16.

Описанъ недавно съ южнаго берега Каспія. Вѣроятно, встрѣчается и въ Талышѣ.

### *Carpodacus* Kaup. 1829.

#### 43. *Carpodacus rubicillus rubicillus* Guld. Кавказскій щуръ.

*Loxia rubicilla* Guldénstätt, Nov. Comm. St. Pétersb., XIX, p. 463, Taf. XII (1775).

*Corythus rubicilla* Богдановъ, Пт. Кавк., 68.

*Carpodacus rubicillus* Радде, Orn. Caucas., 129; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 601.

*Carpodacus rubicilla* Россиковъ, СВ. Кавк., 55.

*Carpodacus rubicilla rubicilla* Hartert, I, 99.

Верхній поясъ Кавказскаго хребта.

#### 44. *Carpodacus erythrinus erythrinus* Pall. Чечевица.

*Loxia erythrina* Pallas, Nov. Comm. Acad. Sc. St. Pétersb., XIV, 587, Taf. 23, Fig. 1 (1770).

*Carpodacus erythrinus* Радде, Orn. Caucas., 128; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 596.

Гнѣздится въ удобныхъ мѣстахъ на плоскости Сѣвернаго Кавказа.

45. *Carpodacus erythrinus roseatus* Hords.

*Pyrrhuloxia roseata* Hodgson, Proc. Zool. Soc. London, 1845, p. 36.

*Carpodacus erythrinus*: Богдановъ, Пт. Кавк., 68; Радде, Orn. Caucas., 128; Id., Talysch, 15; Lorenz, Beitrag, 15; Билькевичъ, Дагестанъ, 15; Вильконскій, Аджарія, 96; Цвѣтковъ, 83; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 12; Catal., 173.

*Carpodacus erythrinus roseatus* Сатунинъ, Матеріалы, 16.

*Carpodacus erythrina roseata* Hartert, I, 108.

Гнѣздящаяся форма всего Кавказскаго края пока еще систематически не выяснена и предположительно относится къ *C. e. roseatus*. Держится главнымъ образомъ въ субъ-альпійской полосѣ.

*Loxia* Linn. 1758.

46. *Loxia curvirostra caucasica* Buturlin. Клестъ-еловикъ кавказскій.

*Loxia curvirostra caucasica* Buturlin, Reichenow's Ornitholog. Monatsber., Janu. 1907, p. 8.

*Loxia curvirostra* Радде, Orn. Caucas., 127; Билькевичъ, Дагестанъ, 15; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 577; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 13; Catal., 175.

*Loxia curvirostra caucasica* Сатунинъ, Матеріалы, 18.

*Loxia sp?* Динникъ, Орн. набл., 324.

Хвойные лѣса всего края.

Примѣч. М. Богдановъ и Г. И. Радде приводятъ въ своихъ сочиненіяхъ указаніе А. Нордмана на нахожденіе на Кавказѣ *Loxia pytiopsittacus* L. Но никто изъ послѣдующихъ за Нордманномъ изслѣдователей Кавказа этой птицы не нашелъ и врядъ ли въ настоящее время можетъ быть сомнѣніе, что за *L. pytiopsittacus* Нордманномъ былъ принятъ *L. curvirostra*.

**Fringilla L. 1758.****47. Fringilla coelebs coelebs L. Зябликъ.**

*Fringilla coelebs* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 179 (1758).

*Fringilla coelebs* Богдановъ, Пт. Кавк., 61; Радде, *Ornis Caucas.*, 136; Id., *Talysch*, 16; Россиковъ, Дол. Малки, 38; Динникъ, Орнит. набл., 321; Lorenz, *Beitrag*, 12; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 626; Вильконскій, Аджарія, 98; Цвѣтковъ, 84; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 10; Сатуниинъ, Матеріалы, 18; Кобылинъ, Матеріалы, 47; *Catal.*, 177; *Loudon*, *Reise*, 44.

*Fringilla coelebs coelebs* Hartert, I, 125.

Лѣсной поясъ всего края.

**48. Fringilla montifringilla L. Вьюрокъ.**

*Fringilla Montifringilla* Linné, Syst. Nat. Ed. X, 179 (1758).

*Fringilla montifringilla* Богдановъ, Пт. Кавказа, 62; Радде, *Ornis Caucas.*, 136; Россиковъ, Дол. Малки, 32; Динникъ, Орнит. набл., 322; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 621; Вильконскій, Аджарія, 98; Цвѣтковъ, 84; Сатуниинъ, Матеріалы, 19; *Catal.*, 176; Hartert, I, 130; *Loudon*, *Reise*, 44.

Зимующая птица Предкавказья и Закавказья.

**Montifringilla Brehm 1828.****49. Montifringilla nivalis alpicola Pall.**

*Passer alpicola* Pallas, *Zoogr. Rosso-Asiat.*, II, p. 20 (1811).

*Plectofringilla alpicola* Богдановъ, Пт. Кавк., 67; Динникъ, Орн. набл., 323; Билькевичъ, Дагестанъ, 15.

*Montifringilla alpicola* Радде, *Ornis Caucas.*, 134; Id., *Talysch*, 15; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 618; *Catal.*, 176; Сатуниинъ, Матеріалы, 19.

*Montifringilla nivalis alpicola* Hartert, I, 133.

Альпійская область всего Кавказа. Въ безлѣсныхъ горахъ Карсской области держится гораздо ниже и гнѣздится около самаго Карса.

**Petronia Kaup. 1829.**

50. *Petronia petronia exigua* Hellm. Каменный воробей.

*Passer petronius exiguus* Hellmayer, Orn. Jahrb., 1902, p. 128.

*Purgita petronia* Богдановъ, Пт. Кавк., 61; Радде, Orn. Caucas., 140: Id., Talysch, 16; Lorenz, Beitrag, 12; Билькевичъ, Дагестанъ, 15.

*Petronia petronia* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 639; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 12.

*Petronia petronia exiguus* Hartert, I, 142; Loudon, Reise, 42.

*Petronia petronia exigua* Сатуниинъ, Материалы, 20.

По всему краю. Въ Закавказьѣ осѣдая птица.

**Carospiza Müller 1854.****51. Carospiza brachydactyla Br.**

*Petronia brachydactyla* Bonaparte, Consp. Av., I, p. 513 (1850).

*Carospiza brachydactyla* Плеске (in litt.).

По свидѣтельству О. Д. Плеске, эта птица была добыта въ Эриванской губерніи.

**Passer Koch 1816.**

52. *Passer domesticus domesticus* L. Домашній воробей.

*Fringilla domestica* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 183 (1758).

52. A. *Passer domesticus caucasicus* M. Bogd. Кавказскій воробей,

*Passer domesticus* subsp. *caucasicus* Богдановъ, Птицы Кавказа, 59 (1879).

*Passer domesticus* subsp. *caucasicus* Россиковъ, Дол. Малки, 22; Lorenz, Beitrag, 11.

*Passer domesticus* typ. et varts. *cisalpinus-Italiae*, *caucasicus* et *indicus* Радде, *Ornis Caucas.*, 143; Id., *Talysch*, 16.

*Passer domesticus* Динникъ, Орн. набл., 320; Мензбиръ, Пт. Кавк., II, 632; Вильконскій, Аджарія, 95; Цвѣтковъ, 84; Кобылинъ, Матеріалы, 45.

*Passer domesticus indicus* Дерюгинъ, Чорохск. кр., 12.

*Passer domesticus caucasicus* Сатунинъ, Матеріалы, 20; Loudon, *Reise*, 39.

*Passer domesticus* typ., *caucasicus*, *intermed. indicus* et *niger* Catal., 170.

*Passer domestica domestica* Hartert, I, 147.

Весь край. Относительно систематическаго положенія кавказскаго воробья, какъ видно изъ приведенной литературы, мнѣнія орнитологовъ раздѣляются. Я склоняюсь въ пользу мнѣнія, что закавказскій воробей представляетъ переходъ къ *P. indicus*, на Сѣверномъ же Кавказѣ, а, можетъ быть, и въ западномъ Закавказьѣ встрѣчается и типичная форма.

53. *Passer hispaniolensis transcaspicus* Tschusi. Черногрудый воробей.

*Passer hispaniolensis transcaspicus* Tschusi, *Orn. Jahrb.*, 1903, p. 10.

*Passer salicarius* Богдановъ, Пт. Кавк., 60; Lorenz, *Beitrag*, 19.

*Passer salicicolus* Радде, *Ornis Caucas.*, 148; Id., *Talysch*, 16.

*Passer hispaniolensis* Catal., 171; Loudon, *Reise*, 39.

*Passer hispaniolensis transcaspicus* Сатунинъ, Матеріалы, 21; Hartert, I, 157.

Восточное Закавказье, откуда залетаетъ и въ другія части края.

54. *Passer montanus transcaucasicus* Buturlin. Кавказскій полевой воробей.

*Passer montanus transcaucasicus* Buturlin, *Ibis*, 1906, p. 423.

*Salicipasser montanus* Богдановъ, Пт. Кавк., 60; Росси-ковъ, Дол. Малки, 22; Динникъ, Орн. набл., 320.

*Passer montanus* Радде, *Ornis Caucas.*, 147; Id., *Talysch*, 16; Lorenz, *Beitrag*, 12; Цвѣтковъ, 84; Сатунинъ, Мате-ріалы, 23; *Catal.*, 16.

*Passer montana montana* Hartert, I, 160.

*Passer montanus transcaucasicus* Бутурлинъ, Сборы Кобылина, 12; Кобылинъ, Матеріалы, 46; Loudon, *Rei-се*, 38.

Весь край, но вездѣ малочисленъ.

### *Miliaria* Brehm 1831.

#### 55. *Miliaria calandra calandra* L. Просянка.

*Emberiza Calandra* Linné, *Syst. Nat. Ed. X*, p. 176 (1758).

#### 56. *Miliaria calandra caucasica* But. Кавказская просянка.

*Crithophaga miliaria* var. *minor* Радде, *Ornis Caucas.*, 154 (1884); *Miliaria calandra caucasica* nom. emend. Бутурлинъ, *Наша Охота*, 1909, XI, 90.

*Miliaria eugoraea* Богдановъ, Пт. Кавк., 70; Росси-ковъ, Дол. Малки, 39.

*Crithophaga miliaria* typ. et var. *minor* Radde, *Talysch*, 16.

*Emberiza miliaris* Lorenz, *Beitrag*, 18.

*Emberiza miliaria* Динникъ, Орн. набл., 326; Биль-кевичъ, Дагестанъ, 16; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 562; Вилько-нскій, Аджарія, 94; Цвѣтковъ, 82; *Catal.*, 165; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 13; Кобылинъ, Матеріалы, 45.

*Miliaria calandra* Сатунинъ, Матеріалы, 24.

*Emberiza calandra calandra* Hartert, I, 165.

Вторая форма живетъ осѣдло въ Закавказьѣ. Относятся ли къ этой формѣ или къ первой просянки Сѣвернаго Кав-каза, еще не выяснено.

*Emberiza* L. 1758.57. *Emberiza citrinella erythrogenys* Brehm. Обыкновенная овсянка.

*Emberiza erythrogenys* Brehm, Vogelfang, p. 414 (1855).

*Emberiza citrinella* Богдановъ, Пт. Кавк., 70; Радде, Orn. Caucas., 150; Id., Talysch, 17; Россиковъ, Дол. Малки, 34; Динникъ, Орн. набл., 325; Lorenz, Beitrag, 18; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 553; Вильконскій, Аджарія, 94; Цвѣтковъ, 82; Catal., 166.

*Emberiza citrinella erythrogenys* Сатунинъ, Матеріалы, 24; Кобылинъ, Матеріалы, 44; Hartert, I, 169; Loudon, Reise, 37.

По всему краю.

58. *Emberiza melanocephala* Scop. Черноголовая овсянка.

*Emberiza melanocephala* Scopoli, Annus I Hist. Nat., p. 142 (1769).

*Euspiza melanocephala* Богдановъ, Пт. Кавк., 69; Радде, Orn. Caucas., 149; Id., Talysch, 16; Lorenz, Beitrag, 17.

*Emberiza melanocephala* Билькевичъ, Дагестанъ, 16; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 567; Вильконскій, Аджарія, 93; Цвѣтковъ, 82; Catal., 169; Сатунинъ, Матеріалы, 25; Hartert, I, 170.

По всему краю, преимущественно въ степяхъ и предгорьяхъ до 5000'.

59. *Emberiza cirrus* L.

*Emberiza Cirrus* Linné, Syst. Nat. Ed. XII, I, p. 131 (1766).

*Emberiza cirrus* Радде, Orn. Caucas., 150; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 557; Hartert, I, 175.

Малый Кавказъ, рѣдокъ.

60. *Emberiza hortulana* L. Садовая овсянка.

*Emberiza Hortulana* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 177 (1758).

*Glycispina hortulana* Богдановъ, Пт. Кавк. 71.

*Emberiza hortulana* Радде, *Ornis Caucas.*, 151; Id., *Talysch*, 16; Динникъ, Орн. набл., 325; Logenz, *Beitrag*, 17; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 545; Вильконскій, Аджарія, 93; Цвѣтковъ, 81; *Catal.*, 167; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 14; Сатунинъ, Матеріалы, 26; *Hartert*, I, 180.

По всему краю до 6000'.

#### 61. *Emberiza buchanani* Blyth.

*Emberiza Buchananii* Blyth, *Journ. Asiat. Soc. Bengal*, XIII, p. 957 (1844).

*Glycispina Huttoni* Богдановъ, Пт. Кавк., 71.

*Emberiza Huttoni* Радде, *Ornis Caucas.*, 153; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 548; *Catal.*, 163.

*Emberiza buchanani* *Hartert*, I, 182.

Среднее теченіе Аракса, каспійское побережье.

#### 62. *Emberiza caesia* Cretzschm. Красноклювая овсянка.

*Emberiza caesia* Cretzschmar, *Atlas z. Reise von E. Rüppel, Vögel*, p. 17, Taf. 10 (1826).

*Emberiza caesia* Радде, *Ornis Caucas.*, 153; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 552; *Catal.*, 168; *Hartert*, I, 182.

Закавказье; рѣдокъ.

#### 63. *Emberiza cia* par *Hartert*. Горная овсянка.

*Emberiza cia* par *Hartert*, *Vögel paläarktisch. Fauna*, I, 184 (1904).

*Hylaespiza cia* Богдановъ, Пт. Росс., 71; Россиковъ, Дол. Малки, 35.

*Emberiza cia* Радде, *Ornis Caucas.*, 152; Динникъ, Орн. набл., 325; Logenz, *Beitrag*, 18; Вилькевичъ, Дагестанъ, 16; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 549; Вильконскій, Аджарія, 94; Цвѣтковъ, 82; *Catal.*, 168; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 13.

*Emberiza cia* par Сатунинъ, Матеріалы, 27; London, *Reise*, 37.

Горныя мѣстности до 7000'.

64. *Emberiza schoeniclus tschusii* Reiser & Almásy. Камышевая овсянка.

*Emberiza schoeniclus tschusii* Reiser & Almásy, *Aquila*, V, p. 122—125 (1898).

*Cynchramus schoeniclus* Богдановъ, Пт. Кавк., 72; Радде, *Ornis Caucas.*, 155; Россиковъ, Дол. Малки, 23; Динникъ, Орн. набл., 326; Lorenz, *Beitrag*, 18; London, *Reise*, 36.

*Emberiza schoeniclus* Мензбирь, Пт. Росс., II, 535; Вильконскій, Аджарія, 95; *Catal.*, 166.

*Emberiza schoeniclus Tschusii* Сатунинъ, Материалы, 27; Hartert, I, 198.

Весь край до 6300' (Радде).

65. *Emberiza pyrrhuloides pyrrhuloides* Pall. Толстоклювая овсянка.

*Emberiza pyrrhuloides* Pallas, *Zoogr. Rosso-Asiat.*, II, 49 (1821).

*Cynchramus pyrrhuloides* Богдановъ, Пт. Кавк., 72; Радде, *Ornis Caucas.*, 156; Id., *Talysch*, 16; London, *Reise*, 37.

*Emberiza pyrrhuloides* Мензбирь, Пт. Росс., II, 539; *Catal.*, 166.

*Emberiza pyrrhuloides pyrrhuloides* Hartert, I, 198.

Каспійское побережье.

### *Passerina Vieill* 1816.

66. *Passerina nivalis* L. Подорожникъ.

*Emberiza nivalis* Linné, *Syst. Nat. Ed. X*, 176 (1758).

*Plectrophanes nivalis* Радде, *Ornis Caucas.*, 156; Мензбирь, Пт. Росс., II, 527; *Catal.*, 165.

*Passerina nivalis nivalis* Hartert, I, 202.

Извѣстенъ лишь одинъ случай залета подорожника въ Закавказье (Александрополь). На Сѣверномъ Кавказѣ его наблюдали зимою нѣсколько разъ.

## Fam. Alaudidae\*.

*Melanocorypha* Boie 1828.

67. *Melanocorypha calandra calandra* L. Большой степной жаворонокъ.

*Alauda Calandra* Linné, Syst. Nat. Ed. XII, I, 288 (1766).

*Melanocorypha calandra* Богдановъ, Пт. Кавк., 76; Радде, Orn. Caucas., 157; Id., Talysch, 17; Россиковъ, Дол. Малки, 41; Динникъ, Орн. набл., 326; Lorenz, Beitrag, 39; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 435; Вильконскій, Аджарія, 90; Catal., 183; Сатунинъ, Матеріалы, 28; Кобылинъ, Матеріалы, 43; Bianchi, Alaudidae, 42; Loudon, Reise, 47.

*Melanocorypha calandra calandra* Hartert, I, 208.

Степи всего края.

68. *Melanocorypha bimaculata* Ménétr.

*Alauda bimaculata* Ménétries, Catal. Rais., 37 (1832).

*Melanocorypha bimaculata* Богдановъ, Пт. Кавк., 76; Радде, Orn. Caucas., 157; Id., Talysch, 17; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 435; Catal., 183; Сатунинъ, Матеріалы, 28; Hartert, I, 210; Bianchi, Alaudidae, 43.

Восточное Закавказье.

*Pterocorys* Stejn. 1884.69. *Pterocorys sibiricus* Gm. Сибирскій жаворонокъ.

*Alauda sibirica* Gmelin, Syst. Nat., I, p. 799 (1788).

\* Систематика и номенклатура этого семейства, за немногими исключениями, по Бианки. См. его статьи: Дополнительные замѣтки о палеарктических жаворонкахъ (Alaudidae) (Изв. И. Акад. Наукъ, 1905, окт., V сер., т. XXIII, № 3) и „Catalogue of the known Species of Alaudidae or Family of Larks, with a Table showing the geographical distribution and a Key to the Genera“ (Изв. И. Акад. Наукъ, 1906, июнь и сент., V сер., т. XXV, № 1 и 2).

*Melanocorypha leucoptera* Богдановъ, Пт. Кавк., 76; Динникъ, Орн. набл., 326; Россиговъ, СВ. Кавк., 46.

*Melanocorypha sibirica* Радде, *Ornis Caucas.*, 160; Id., *Talysch*, 17; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 432; *Catal.*, 184; Вильконскій, Аджарія, 91; Hartert, I, 211.

*Pterocorys sibirica* Bianchi, *Alaudidae*, 41.

Зимою залетаетъ не только на Сѣверный Кавказъ, но и въ Закавказье.

### *Saxilauda* Lesson 1837.

70. *Saxilauda yeltoniensis* Forst. Черный жаворонокъ.

*Alauda yeltoniensis* Forster, *Philos. Transact.*, LVII, p. 350 (1767).

*Nigrilauda tatarica* Богдановъ, Пт. Кавк., 76; Динникъ, Орн. набл., 328.

*Melanocorypha tatarica* Радде, *Ornis Caucas.*, 159; Id., *Talysch*, 17; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 429; *Catal.*, 184.

*Saxilauda yeltoniensis* Bianchi, *Alaudidae*, 39.

*Melanocorypha yeltoniensis* Hartert, I, 213; *Catal.*, 184.

Зимою залетаетъ въ Предкавказье.

### *Calandrella* Kaup. 1829.

71. *Calandrella brachydactyla brachydactyla* Leisler. Малый степной жаворонокъ.

*Alauda brachydactyla* Leisler, *Ann. Wetter. Gesell.*, III, 1814.

*Calandrella brachydactyla* Богдановъ, Пт. Кавк., 75; Динникъ, Орн. набл., 327; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 439; Вильконскій, Аджарія, 90; Сатунинъ, Матеріалы, 28; Кобылинъ, Матеріалы, 43; Bianchi, *Alaudidae*, 48.

*Calandrella brachydactyla typ.* Радде, *Ornis Caucas.*, 161; Id., *Talysch*, 17; *Catal.*, 184.

*Calandrella brachydactyla brachydactyla* Hartert, I, 214.

Степи всего края.

*Pseudalaudula* Bianchi 1906.72. *Pseudalaudula pispoletta pispoletta* Pall. Сѣрый жаворонокъ.

*Alauda pispoletta* Pallas, Zoogr. Rosso-As., I, p. 526 (1811).

*Calandrella pispoletta* Богдановъ, Пт. Кавк., 75; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 441; Catal., 185; Сатунинъ, Матеріалы, 29.

*Calandrella brachydactyla* var. *pispoletta* Радде, Orn. Caucas., 161; Id., Talysch, 17.

*Alaudula pispoletta* Дерюгинъ, Чорохск. кр., 15.

*Calandrella minor heinei* Hartert, I, 219.

*Pseudalaudula pispoletta* Bianchi, Alaudidae, 44.

Закавказье; преимущественно восточное.

Неосновательность доводовъ Hartert'а въ пользу измѣненія просуществовавшаго уже 100 лѣтъ названія „*pispoletta*“ на „*minor*“ уже ясно разъяснена В. Л. Бианки (Изв. И. Акад. Наукъ, 1905, окт. (V), XXIII, № 3, 222).

*Galerida* Boie 1828.73. *Galerida cristata cristata* L. Обыкновенный хохлатый жаворонокъ.

*Alauda cristata* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 166 (1758).

74. *Galerida cristata caucasica* Tacz. Кавказскій хохлатый жаворонокъ.

*Galerida cristata caucasica* Taczanowski, Bull. Soc. Zool. de France, 1887, p. 621.

*Galerita cristata* Богдановъ, Пт. Кавк., 73; Росиковъ, Долина Малки, 23; Динникъ, Орн. набл., 327; Lorenz, Beitrag, 39; Catal., 182; Bianchi, Alaudidae, 63.

*Galerita cristata* typ. et varts: *isabellina* et *macrorhyncha* Радде, Orn. Caucas., 164; Id., Talysch, 17.

*Alauda cristata* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 443; Вильконскій, Аджарія, 90; Цвѣтковъ, 80.

*Galerida cristata caucasica* Сатунинъ, Матеріалы, 29; Hartert, I, 230; Bianchi, Alaudidae, 65; Loudon, Reise, 47.

Весь край. Въ Закавказьѣ вторая форма преобладаетъ, первая же встрѣчается рѣдко.

### *Lullula* Kaup. 1829.

75. *Lullula arborea* L. Лѣсной жаворонокъ, юла.

*Alauda arborea* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 166 (1758).

*Corys arborea* Богдановъ, Пт. Кавк., 74; Catal., 181.

*Lullula arborea* Радде, Orn. Caucas., 166; Id., Talysch, 17; Bianchi, Alaudidae, 54; Hartert, I, 241.

*Alauda arborea* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 452; Цвѣтковъ, 80.

*Lullula arborea* Сатунинъ, Матеріалы, 29.

Лѣсная область всего края.

### *Alauda* L. 1758.

76. *Alauda arvensis arvensis* L. Полевой жаворонокъ.

*Alauda arvensis* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 175 (1758).

*Alauda arvensis typicus* Богдановъ, Пт. Кавк., 74.

*Alauda arvensis* Россиковъ, Дол. Малки, 41; Диникъ, Орн. набл., 327; Lorenz, Beitrag, 39; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 447.

*Alauda arvensis arvensis* Hartert, I, 244.

Гнѣздящаяся птица Предкавказья.

77. *Alauda arvensis armenica* Bogd. Закавказскій полевой жаворонокъ.

*Alauda arvensis* subsp. *armenicus* М. Богдановъ, Пт. Кавк., 75 (1879).

*Alauda arvensis* Радде, Orn. Caucas., 166; Id., Talysch, 17; Вильконскій, Аджарія, 90; Catal., 180; Цвѣтковъ, 80; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 15; Сатунинъ, Матеріалы, 30; Кобылинъ, Матеріалы, 42.

*Alauda arvensis armenica* Loudon, Reise, 45.

Все Закавказье.

78. *Alauda arvensis cinerea* Ehmcke.

*Alauda cinerea* Ehmcke, Journ. f. Orn., 1903, p. 149.

*Alauda arvensis cinerea* Hartert, I, 247; Сатунинъ, Матеріалы, 30.

Зимою въ Предкавказьѣ.

79. *Alauda gulgula inconspicua* Sev. Туркестанскій полевой жаворонокъ.

*Alauda inconspicua* Severzow, Сѣверцовъ, Вертик. и горизонт. распред. туркест. животныхъ, 142 (1873).

*Alauda gulgula inconspicua* Hartert, I, 249; Бутурлинъ, Наша Охота, ? 1908 \*.

Однажды осенью добытъ на берегу моря у Ленкорани (Цыссь).

*Otocoris* Bonaparte 1838.

80. *Otocoris alpestris flava* Gmelin. Полярный жаворонокъ.

*Alauda flava* Gmelin, Syst. Nat., I, p. 800 (1788).

*Otocoris alpestris* typ. Радде, Orn. Caucas., 162; Id., Talysch, 17; Catal., 182.

*Phileremos alpestris* Россиковъ, Дол. Малки, 35; Id., СВ. Кавк., 46.

*Otocoris alpestris* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 423; Bianchi, Alaudidae, 18.

*Otocoris alpestris flava* Сатунинъ, Матеріалы, 30.

*Eremophila alpestris flava* Hartert, I, 255.

Найденъ на пролетѣ въ центральномъ Закавказьѣ (Тифлисъ) и на зимовкѣ въ Предкавказьѣ.

\* Къ сожалѣнію, на отдѣльных оттискахъ этого журнала до 1909 г. не обозначался ни годъ, ни № книжки. Къ тому же, такія замѣтки С. А. Бутурлина идутъ подъ общимъ заглавіемъ „Интересныя находки“, безъ нумераціи статей. Все это дѣлаетъ цитированіе этихъ статей крайне затруднительнымъ.

81. *Otocoris penicillata penicillata* Gould. Горный рогатый жаворонокъ.

*Alauda penicillata* Gould, Proc. Zool. Soc. London, 1837, p. 126.

*Otocoris penicillata* Богдановъ, Пт. Кавк., 73; Lorenz, Beitrag, 38; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 427; Цвѣтковъ, 79; Catal., 182; Сатунинъ, Матеріалы, 30; Кобылинъ, Матеріалы, 42; Bianchi, Alaudidae, 27.

*Otocoris alpestris* varts. *penicillata et larvata* Радде, Orn. Caucas., 162; Id., Talysch, 182.

*Otocoris alpestris* Билькевичъ, Дагестанъ, 16.

*Eremophila alpestris penicillata* Hartert, I, 261.

Горная область всего края.

82. ? *Otocoris penicillata albigula* Bonap. Бѣлогордый рогатый жаворонокъ.

*Otocoris albigula* Bonaparte, Consp. Av., I, p. 246 (1850).

*Otocoris alpestris* var. *albigula* Радде, Orn. Caucas., 162.

*Otocoris penicillata* subsp. ? (an *albigula* Bonap.?) Сатунинъ, Матеріалы, 31.

*Eremophila alpestris albigula* Hartert, I, 262.

*Otocoris penicillata albigula* Bianchi, Alaudidae, 28.

Найденъ одинъ разъ зимою на Крестовомъ перевалѣ.

## Fam. Motacillidae.

*Anthus* Bechstein 1807.

83. *Anthus campestris campestris* L. Щеврица полевая.

*Alauda campestris* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 166 (1758).

*Agrodroma campestris* Богдановъ, Пт. Кавк., 110.

*Anthus campestris* Радде, Orn. Caucas., 168; Id., Talysch, 17; Динвигъ, Орн. набл., 349; Билькевичъ, Дагестанъ, 12 (partim!); Мензбиръ, Пт. Росс., II, 748; Вильконскій, Аджарія,

104; Цвѣтковъ, 88; Catal., 157; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 16; Сатунинъ, Матеріалы, 31; Loudon, Reise, 31.

*Anthus Richardi* Радде, *Ornis Caucas.*, 168.

*Anthus campestris campestris* Hartert, I, 267.

Весь край.

84. *Anthus trivialis trivialis* L. Щеврица лѣсная.

*Alauda trivialis* Linné, *Syst. Nat. Ed. X*, p. 166 (1758).

*Anthus arboreus* Богдановъ, Пт. Кавк., 109; Радде, *Ornis Caucas.*, 171; Id., Talysch, 17; Динниъ, Орн. набл., 349; Lorenz, Beitrag, 37; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 753; Вильконскій, Аджарія, 104; Цвѣтковъ, 88; Catal., 156.

*Anthus trivialis* Сатунинъ, Матеріалы, 32; Loudon, Reise, 30.

*Anthus trivialis trivialis* Hartert, I, 272.

Весь край.

85. *Anthus pratensis* L. Щеврица луговая.

*Alauda pratensis* Linné, *Syst. Nat. Ed. X*, p. 166 (1758).

*Anthus pratensis* Богдановъ, Пт. Кавк., 110; Радде, *Ornis Caucas.*, 170; Id., Talysch, 17; Динниъ, Орн. набл., 349; Lorenz, Beitrag, 37; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 761; Вильконскій, Аджарія, 104; Сатунинъ, Матеріалы, 32; Кобылинъ, Матеріалы, 42; Catal., 156; Hartert, I, 275; Loudon, Reise, 30.

Весь край.

86. *Anthus cervinus* Pall. Краснозобая щеврица.

*Motacilla cervina* Pallas, *Zoogr. Rosso-Asiat.*, I, p. 511 (1827).

*Anthus cervinus* Радде, *Ornis Caucas.*, 171; Id., Talysch, 17; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 757; Вильконскій, Аджарія, 104; Catal., 156; Кобылинъ, Матеріалы, 42; Loudon, Reise, 30.

*Anthus cervina* Hartert, I, 277.

Сѣверо-западное Предкавказье и западное Закавказье, на пролетѣ.

87. *Anthus spinoletta blakistoni* Swinh. Горная шеврица.

*Anthus blakistoni* Swinhoe, Proc. Zool. Soc. London, 1863, p. 90.

*Anthus spinoletta* Богдановъ, Пт. Кавк., 109; Радде, Orn. Caucas., 169; Id., Talysch, 17; Россияковъ, СВ. Кавк., 55; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 745; Вильконскій, Аджарія, 103; Цветковъ, 88; Catal., 157; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 15; Сатунинъ, Матеріалы, 33.

*Anthus aquaticus* Lorenz, Beitrag, 37.

? *Anthus campestris* (partim!) Вилькевичъ, Дагестанъ, 12.

*Anthus spinoletta blakistoni* Hartert, I, 282.

Горная область всего края.

88. *Anthus spinoletta obscurus* Lath.

*Alauda obscura* Latham, Index Orn., II, p. 494 (1790).

*Anthus obscurus* Радде, Orn. Caucas., 172; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 743; Catal., 157.

*Anthus spinoletta obscura* Hartert, I, 283.

По Радде, однажды зимою добытъ у Тифлиса.

*Budytes* Cuvier 1817.

89. *Budytes flavus flavus* L. et intermed. Желтая плиска

*Motacilla flava* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 175 (1758).

*Budytes flava* Богдановъ, Пт. Кавк., 108; Lorenz, Beitrag, 36; Кобылинъ, Матеріалы, 40; Loudon, Reise, 28.

*Budytes flavus* Радде, Orn. Caucas., 173; Id., Talysch, 17; Сатунинъ, Матеріалы, 33.

*Budytes flavus* typ., interm. viridis, viridis, „interm. cinereoscap. typ.“ (!) Catal., 153.

*Motacilla flava* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 770; Вильконскій, Аджарія, 105; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 17.

*Motacilla flava flava* Hartert, I, 287.

Весь край.

90. *Budytes flavus borealis* Sund.

*Motacilla flava* var. *borealis* Sundevall, Kongl. Vetens. K. Acad. Handlingar. Stockholm för 1840, p. 53 (1842).

? *Budytes melanocephalus* var. *viridis* = *cine-reoscapilla* = *borealis* Радде, Orn. Caucas., 174.

*Motacilla borealis* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 770.

*Budytes borealis* Catal., 153.

*Budytes flava borealis* Кобылинъ, Матеріалы, 41.

*Motacilla flava borealis* Hartert, I, 291.

На пролетѣ.

91. *Budytes melanocephalus* Licht. Черноголовая плиска.

*Motacilla melanocephala* Lichtenstein, Vez. Doubl. Zool. Mus. Berlin, p. 36 (1823).

*Budytes melanocephala* Богдановъ, Пт. Кавк., 109; Динникъ, Орн. набл., 348; Lorenz, Beitrag, 37.

*Budytes melanocephalus* typ. et varts: *Kaleniczenskii* et *viridis* Радде, Orn. Caucas., 174; Id., Talysch, 17.

*Budytes melanocephalus* Сатунинъ, Матеріалы, 34.

*Budytes melanocephalus* typ., *Feldeggi*, *inter-med. borealis*, *paradoxa* Catal., 153.

*Motacilla feldeggi* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 776; Вильконскій, Аджарія, 106; Цвѣтковъ, 89.

*Motacilla xanthophrys* Вильконскій, Аджарія, 106.

*Motacilla paradoxa* Вильконскій, Аджарія, 106.

*Motacilla flava melanocephala* Hartert, I, 295.

Весь край.

92. *Budytes campestris* Pall. Желтолобая плиска.

*Motacilla campestris* Pallas, Reise d. versch. Prov. d. Russ. Reiches, III, p. 696 (1776).

*Budytes Rayi* Радде, Orn. Caucas., 172; Id., Talysch, 17.

*Budytes campestris* Сатунинъ, Матеріалы, 34; Catal., 154.

*Motacilla flava campestris* Hartert, I, 294.

На пролетѣ по каспійскому побережью.

93. *Budytes citreolus citreolus* Pall. Желтоголовая плиска.

*Motacilla citreola* Pallas, Reise d. versch. Prov. d. Russ. Reiches, III, p. 696 (1776).

*Budytes citreolus* Радде, Orn. Caucasica, 172.

*Budytes citreola* Lorenz, Beitrag, 36.

*Motacilla citreola* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 778.

*Motacilla citreola citreola* Hartert, I, 296.

На пролетъ по каспійскому побережью.

94. *Motacilla boarula boarula* L. Горная трясогузка.

*Motacilla boarula* Linnaeus, Mantissa Plantarum, p. 527 (1771).

*Motacilla boarula boarula* Hartert, I, 298.

95. *Motacilla boarula melanore* Pall. Кавказская горная трясогузка.

*Motacilla Melanore* Pallas, Reise d. versch. Prov. d. Russ. Reiches, III, p. 696 (1776).

*Colobates sulphurea* Богдановъ, Пт. Кавк., 108; Динникъ, Орн. набл., 348; Lorenz, Beitrag, 36; Россиковъ, СВ. Кавк., 52.

*Motacilla boarula* Радде, Orn. Caucas., 175; Id., Tallysch, 18; Catal., 154.

*Colobates boarula* Бутурлинъ, Наша Охота, 1908?, 2.

*Motacilla melanore* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 781; Вильконскій, Аджарія, 105; Цвѣтковъ, 89; Кобылинъ, Матеріалы, 41; London, Reise, 29.

*Budytes boarula* Дерюгинъ, Чорохск. кр., 16.

*Motacilla boarula melanore* Сатунинъ, Матеріалы, 35; Hartert, I, 300.

Горныя мѣстности всего края. Около Ленкорани кромѣ обычной для Кавказа восточной формы *M. b. melanore* найдена и западная *M. b. boarula* (Бутурлинъ l. c.).

96. *Motacilla alba alba* L. Бѣлая трясогузка.

*Motacilla alba* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 185 (1758).

*Motacilla alba* Богдановъ, Пт. Кавк., 106; Динникъ, Орн. набл., 348; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 784; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 16; Loudon, Reise, 29.

*Motacilla alba* typ. Раде, Orn. Caucas., 175; Id., Talysch, 18.

*Motacilla alba alba* Hartert, I, 302.

Предкавказье; зимою, вѣроятно, и въ Закавказьѣ.

#### 97. *Motacilla alba dukhunensis* Sykes.

*Motacilla Dukhunensis* Sykes, Proc. Zool. Soc. London, 1832, p. 91.

*Motacilla dukhunensis* Богдановъ, Пт. Кавк., 107; Динникъ, Орн. набл., 348; Lorenz, Beitrag, 35; Сатунинъ, Матеріалы, 36.

*Motacilla lugubris* Богдановъ, Пт. Кавк., 108.

*Motacilla alba* varts: *personata*, *persica*, *lugubris*, *luzoniensis*, *dukhunensis* Раде, Orn. Caucas., 175; Id., Talysch, 18.

*Motacilla persica* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 788.

*Motacilla alba* Вильконскій, Аджарія, 105; Цвѣтковъ, 89.

*Motacilla alba* typ., *dukhunensis*, *baicalensis*, *intermedia alba*, *luzoniensis* Catal, 154.

*Motacilla alba orientalis* Бутурлинъ, Сборы Кобылина, 12; Кобылинъ, Матеріалы, 41.

*Motacilla alba* (subsp.?) Сатунинъ, Матеріалы, 35.

*Motacilla alba dukhunensis* Hartert, I, 304; Loudon, Reise, 29.

Весь край.

### Fam. Certhiidae

#### *Certhia* L. 1758.

#### 98. *Certhia familiaris familiaris* L. Пищуха.

*Certhia familiaris* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 118 (1758).

99. *Certhia familiaris caucasica* Кавказская пищуха.

*Certhia familiaris caucasica* Buturlin, Reichenow's Ornithol. Monatsbericht, Janu. 1907, 8.

*Certhia familiaris*\* Богдановъ, Пт. Кавк., 111; Радде, *Ornis Caucas.*, 238; Россиковъ, Дол. Малки, 37; Динникъ, Орн. набл., 338; Lorenz, Beitrag, 35; Россиковъ, СВ. Кавк., 47; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 669; Вильконскій, Аджарія, 102; Цвѣтковъ, 85; Кобылинъ, Матеріалы, 40.

*Certhia familiaris* typ. Catal., 159.

*Certhia familiaris familiaris* Hartert, I, 317.

*Certhia familiaris caucasica* Сатунинъ, Матеріалы, 36.

Гнѣздящаяся форма Сѣвернаго Кавказа еще не выяснена. Во всякомъ случаѣ, обыкновенная пищуха, вѣроятно, бываетъ тамъ зимою. Въ Закавказьѣ, кромѣ Талыша, широкого распространена *C. f. caucasica*.

100. *Certhia familiaris persica* Zar. & Loud. Персидская пищуха.

*Certhia familiaris persica* Zarudny & Loudon, Reichenow's Ornith. Monatsb., 1905, p. 105.

*Certhia familiaris* Radde, Talysch, 21.

*Certhia talyschensis* Бутурлинъ, Наша Охота, 1908, сент., 6 и окт., 3.

Талышъ.

*Tichodroma* Ill. 1811.101. *Tichodroma muraria* L. Стѣнолазь.

*Certhia muraria* Linné, Syst. Nat. Ed. XII, p. 184 (1766).

*Tichodroma muraria* Богдановъ, Пт. Кавк., 112; Радде, *Ornis Caucas.*, 239; Id., Talysch, 21; Вилькевичъ, Даге-

\* Такъ какъ прежніе авторы не различали подвиговъ пищухи и въ большинствѣ случаевъ невозможно разобрать, къ какому изъ нихъ относится показаніе даннаго автора, я привожу всю литературу о *Certhia familiaris* вмѣстѣ, за исключеніемъ относящейся только къ Талышу.

станъ, 12; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 666; Вильконскій, Аджарія, 103; Catal., 159; Цвѣтковъ, 85; Сатунинъ, Матеріалы, 37; Кобылинъ, Матеріалы, 40; Hartert, I, 327.

*Tichodroma phoeniceptera* Lorenz, Beitrag, 35.

Горы всего края.

## Fam. Sittidae.

*Sitta* L. 1758.

102. *Sitta europaea caucasica* Reich. Кавказскій поползень.

*Sitta caesia caucasica* Reichenow, Orn. Monatsber., 1901, p. 53.

*Sitta caesia* Богдановъ, Пт. Кавк., 112; Радде, Orn. Caucas., 236; Динникъ, Orn. набл., 337; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 794; Вильконскій, Аджарія, 101; Цвѣтковъ, 89; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 17.

*Sitta europaea caucasica* Сатунинъ, Матеріалы, 37; Кобылинъ, Матеріалы, 38; Hartert, I, 333.

Весь край, кромѣ Талыша.

103. *Sitta europaea rubiginosa* Zarudny. Талышинскій поползень.

*Sitta caesia rubiginosa* Zarudny, Orn. Jahrb., 1905, p. 140.

*Sitta caesia* Radde, Talysch, 20; Id., Orn. Caucas. (partim!), 236; Catal., 151 (№ 108 b, p, q, r, z, aa, bb).

Талышъ.

104. *Sitta krüperi* Pelz. Малоазіатскій поползень.

*Sitta Krüperi* Pelzeln, Sitzungsber. Akad. Wien, 48, I, p. 149 (1863).

*Sitta Krüperi* Lorenz, Beitrag, 35; Catal., 152.

*Sitta krüperi* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 800; Вильконскій, Аджарія, 101; Сатунинъ, Матеріалы, 38; Hartert, I, 336.

Поясъ ели западнаго Закавказья и западной части Большаго Кавказа.

105. *Sitta neumayer parva* But. Кавказскій скалистый поползень.

*Rupisitta neumayeri parva* Buturlin, Ibis, 1906, July, p. 417.

*Sitta rupicola* Богдановъ, Ит. Кавк., 113.

*Sitta Neumayeri* Богдановъ, Ит. Кавк., 113.

„*Sitta syriaca* typ. = *S. Neumayeri* et var. *rupicola*“ Радде, Ornith. Caucas., 237.

*Sitta syriaca* typ. et var. *rupicola* Radde, Talysch, 20; Catal., 152.

*Sitta neumayeri* Мензбиръ, Ит. Росс., II, 798; Цветковъ, 89; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 17.

*Sitta neumayer neumayer* Hartert, I, 338.

*Sitta parva* Бутурлинъ, Сборы Кобылина, 8; Loudon, Reise, 26.

*Sitta syriaca parva* Сатунинъ, Материалы, 38.

Закавказье.

## Fam. Paridae.

### *Parus* L. 1758.

106. *Parus major major* L. Большая синица.

*Parus major* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 189 (1758).

*Parus major* Сатунинъ, Материалы, 39.

*Parus major major* Hartert, I, 341.

Общая литература для *Parus major*:

*Parus major* Богдановъ, Ит. Кавк., 86; Радде, Ornith. Caucas., 107; Id., Talysch, 14; Роскиковъ, Дол. Малки, 23; Диникъ, Орн. набл., 350; Lorenz, Beitrag, 33; Мензбиръ, Ит. Росс., II, 828; Вильконскій, Аджарія, 101; Catal., 149; Цветковъ, 90; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 18; Кобылинъ, Материалы, 39; Loudon, Reise, 26.

Распространена по всему краю бромъ южной части каспійскаго побережья. Сюда относятся тифлисскіе экземпляры, но восточная граница еще не выяснена.

107. *Parus major karelini* Zarudny. Каспійская большая синица.

*Parus major caspius* Zarudny und Loudon, Reichenow's Ornithol. Monatsber., Juny (July) 1905, p. 108.

*Parus major Karelini* nom. emend. Зарудный, Наша Охота, 1910, янв., 138.

*Parus major caspius* Сатуний, Матеріалы, 39.

*Parus major aphrodite* Бутурлинъ, Наша Охота, 1908, окт., 3; 1909, ноябрь, 89.

Южная часть каспійскаго побережья, Талышъ, а, можетъ быть, и вся низменность восточнаго Закавказья.

С. А. Бутурлинъ хотѣлъ отождествить эту форму съ кипрской *Parus major aphrodite* Mod. и указалъ на то, что названіе *caspius* ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть удержано, такъ какъ ранѣе было употреблено для одной трясогузки Гмелинымъ. Но Н. А. Зарудный убѣдительно показалъ, что эта синица не можетъ быть отождествлена съ кипрской, и предложилъ назвать ее, въ случаѣ невозможности оставить названіе „*caspius*“, *Parus major karelini*.

*Cyanistes* Каур. 1829.

108. *Cyanistes caeruleus caeruleus* L. Обыкновенная лазоревка.

*Parus caeruleus* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 190 (1758).

*Parus caeruleus caeruleus* Hartert, I, 347.

*Cyanistes caeruleus typicus* Loudon, Reise, 25.

109. *Cyanistes caeruleus georgicus* But. Закавказская лазоревка.

*Cyanistes caeruleus georgicus* Бутурлинъ, Наша Охота, 1908, окт., 29.

110. *Cyanistes caeruleus colchicus* But. Колхидская лазоревка.

*Parus caeruleus* Вильконскій, Аджарія, 100.

111. *Cyanistes caeruleus satunini* Zarudny. Талышинская лазоревка.

*Cyanistes caeruleus satunini* Zarudny, Reichenow's Ornithol. Monatsber., Janu. 1908, p. 5.

*Cyanistes coeruleus* var. *persicus* Radde, Talysh, 15.

*Cyanistes coeruleus persicus* Loudon, Reise, 25.

*Cyanistes coeruleus* Богдановъ, Пт. Кавк., 88; Россиковъ, Дол. Малки, 23; Динникъ, Орн. набл., 350; Lorenz, Beitrag, 34; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 806; Catal., 148; Цвѣтковъ, 90; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 19; Бутурлинъ, Сборы Кобылина, 10; Сатунинъ, Матеріалы, 41; Кобылинъ, Матеріалы, 40.

*Cyanistes coeruleus* et var. *persicus* Радде, Ornis Caucas., 110.

Какая форма живетъ на Сѣверномъ Кавказѣ, еще неизвѣстно. Типичная *C. c. coeruleus* встрѣчается въ Закавказьѣ, вѣроятно, только зимою; была, напр., найдена барономъ Г. Лоудономъ у Ленкорани.

Гнѣздящіяся формы раздѣлены такъ:

Въ западномъ Закавказьѣ — *C. c. colchicus*.

Въ центральномъ Закавказьѣ (Тифлисская губ.) — *C. c. georgicus*.

Въ Талышѣ и, можетъ быть, и на низменности восточнаго Закавказья — *C. c. satunini*.

### *Periparus* Selys Longch. 1884.

#### 112. *Periparus ater ater* L. Синица московка.

*Parus ater* Linné, Syst. Nat. Ed. XII, p. 190 (1758).

? *Parus Michalowskii* (partim?) Динникъ, Орн. набл., 350.

*Parus ater* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 824.

*Parus ater ater* Hartert, I, 356.

Вѣроятно, зимою встрѣчается въ Предкавказьѣ, гнѣздящаяся форма котораго еще не выяснена.

#### 113. *Periparus ater michalowskii* Bogd. Кавказская горная синица.

*Parus Michalowskii* М. Богдановъ, Пт. Кавк., 87. (1878).

*Parus phaenotus* var. *Michalowskii* Радде, *Ornis Caucas.*, 108.

*Parus Michalowskii* Россиковъ, Дол. Малки, 23; Динникъ, Орн. набл., 350; Lorenz, *Beitrag*, 33; Россиковъ, СВ. Кавк., 49.

? *Parus phaenotus* Динникъ, Орн. набл., 351; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 826 (partim!); Вильконскій, Аджарія, 101; Цвѣтковъ, 90; *Catal.*, 150 (partim!).

*Periparus ater Michalowskii* Сатунинъ, Матеріалы, 40.

*Parus ater michalowskii* Hartert, I, 360.

Вся область Кавказскаго хребта, почти все Закавказье, кромѣ южной его части (по Араксу) и Талыша.

#### 113. a. *Periparus ater derjugini* Sarudny & Loudon.

*Periparus ater* L. var. *derjugini* Sarudny & Loudon, *Orn. Monatsber.*, 1903, p. 129.

*Periparus ater* Дерюгинъ, Чорохск. кр., 18.

*Periparus ater* *Derjugini* Сатунинъ, Матеріалы, 40.

*Parus ater derjugini* Hartert, I, 360.

*Periparus derjugini* Нестеровъ, Изв. Кавк. Муз., V, 226 (1910).

Чорохскій край. По мнѣнію С. А. Бутурлина, это просто *P. a. michalowskii* въ обтрепанномъ перѣ, но въ печатающейся одновременно съ настоящею работою статья П. В. Нестерова (l. c.) послѣдній ясно указалъ крупныя отличія этой формы, которую онъ рассматриваетъ какъ самостоятельный видъ.

#### 114. *Periparus ater phaenotus* Blanf.

*Parus phaenotus* Blanford, *Ibis*, 1873, p. 88.

*Parus phaenotus* Богдановъ, Пт. Кавк., 86; Radde, *Talysch*, 14; Id., *Ornis Caucas.*, 108; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 826; *Catal.*, 150 (partim!).

*Parus ater phaenotus* Hartert, I, 361.

*Periparus phaenotus* Дерюгинъ, Чорохск. кр., 18.

*Periparus ater phaenotus* Сатуниъ, Матеріалы, 40.

По среднему теченію Аракса и въ Талышѣ.

На Араксѣ въ Карягинскомъ \* уѣздѣ эту форму убивалъ я самъ.

***Lophophanes cristatus* Kaup. 1829.**

115. *Lophophanes cristatus cristatus* L. Хохлатая синица.

*Parus cristatus* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 189 (1758).

*Lophophanes cristatus* Богдановъ, Пт. Кавк., 88; Радде, Orn. Caucas., 111; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 802.

*Parus cristatus cristatus* Hartert, I, 363.

Упоминается Нордманномъ. Радде добылъ одинъ экземпляръ у Боржома.

***Poecile* Kaup. 1829.**

116. *Poecile brandti* Bogd. Кавказская гаичка.

*Poecile Brandtii* М. Богдановъ, Птицы Кавк., 89 (1879).

*Poecile Brandti* Радде, Orn. Caucas., 110.

*Parus brandtii* Hartert, I, 369.

Описана по одному экземпляру изъ Боржома. Позднѣе никто этого вида болѣе не видалъ. Видъ загадочный.

117. ? *Poecile lugubris* subsp.? (an *anatoliae* Hartert?).

*Poecile lugubris* Богдановъ, Пт. Кавк., 90; Радде, Orn. Caucas., 110; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 820.

? *Parus lugubris anatoliae* Hartert, I, 368.

По Нордманну, на черноморскомъ побережьи, но позднѣйшими пзслѣдователями не найдена.

118. *Poecile lugubris hyrcanus* Sarudny & Loudon. Персидская гаичка.

*Poecile lugubris hyrcanus* Zarudny & Loudon, Ornith. Monatsber., 1905, p. 76.

\* Бывш. Джебранльскій.

*Poecile lugubris* Radde, Talysch, 14.

?*Poecile sibiricus* (an *P. Brandti*?) Radde, Talysch, 15.

*Parus lugubris hyrcanus* Hartert, I, 369.

Эта гаичка распространена въ Гилѣвѣ, Мазандераѣ и системѣ Эльбурса, и, вѣроятно, найденная въ Ленкоранскомъ уѣздѣ принадлежитъ именно къ этой формѣ.

- 119. *Poecile palustris stagnatilis* Brehm. Болотная гаичка.

*Parus stagnatilis* Brehm, Vogelfang, p. 242 (1855).

*Poecile palustris* Богдановъ, Пт. Кавк., 89; Радде, *Ornis Caucas.*, 109; Lorenz, *Beitrag*, 61; Россиковъ, СВ. Кавк., 49; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 815; *Catal.*, 149.

*Parus palustris stagnatilis* Hartert, I, 371.

По Нордманну, эта гаичка „обыкновенна“ по черноморскому побережью, что, во всякомъ случаѣ, несправедливо. Это довольно рѣдкая птица лѣсного пояса Большого и Малаго Кавказа. По Hartert'у, на Кавказѣ встрѣчается именно эта форма.

120. *Poecile palustris communis* Baldenst.

*Parus cinereus communis* Baldenstein, *Neue Alpina*, II, p. 31 (1827).

*Poecile communis* Дерюгинъ, Чорохск. кр., 18.

*Parus palustris communis* Hartert, I, 372.

Одинъ молодой экземпляръ добытъ у м. Арданучъ.

*Aegithalos* Hermann 1804.

121. *Aegithalos caudatus caudatus* L.

*Parus caudatus* Linné, *Syst. Nat.* Ed. X, p. 190 (1758).

*Acredula caudata* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 833.

*Aegithalos caudatus caudatus* Hartert, I, 382.

Зпмою въ Предкавказьѣ.

122. *Aegithalos caudatus major* Radde.

*Acredula tephronota* var. *major* Радде, *Ornis Caucas.*, 112 (1884).

*Mecistura caudata* Богдановъ, Пт. Кавк., 90.

*Aegithalos caudatus major* Hartert, I, 386.

*Mecistura tephronota* Россиковъ, Дол. Малки, 24; Lorenz, Beitrag, 34; Россиковъ, СВ. Кавк., 48.

*Mecistura Irbyi* subsp. *caucasica* Lorenz, Beitrag, 60.

*Acredula irbyi caucasica* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 837; Цвѣтковъ, 91; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 18.

*Acredula irbyi caucasica* typ. et intermed. Catal., 147.

*Orites irbyi caucasica* Вильконскій, Аджарія, 99.

*Aegithalos irbyi causicus* Сатунинъ, Матеріалы, 41.

*Acredula caudata major* Кобылинъ, Матеріалы, 39.

Весь край, бромъ юго-восточнаго Закавказья.

123. *Aegithalos caudatus tephronotus* Günther.

*Orites tephronotus* Günther, *Ibis*, 1865, p. 95, Taf. IV (1865).

*Acredula tephronota* Radde, *Talysch*, 15; Id., *Ornis Caucas.*, 112; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 838; Сатунинъ, Распространеніе, 4; Catal., 147.

*Aegithalos tephronotus* Сатунинъ, Матеріалы, 42.

*Aegithalos caudatus tephronotus* Hartert, I, 387.

*Mecistura tephronota* Loudon, *Reise*, 25.

Талышъ.

*Anthoscopus* Cab. 1851.124. *Anthoscopus pendulinus pendulinus* L. Ремезъ.

*Motacilla Pendulinus* Linné, *Syst. Nat. Ed. X*, p. 189 (1758).

*Aegithalus pendulinus* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 838; Catal., 147; Loudon, *Reise*, 24.

*Anthoscopus pendulinus pendulinus* Hartert, I, 389.

Пока еще не выяснено, принадлежит ли ремезъ Кубанской области къ этому подвиду или къ слѣдующему.

Зимою достовѣрно найденъ и въ Закавказьѣ.

125. *Anthoscopus caspius caspius* Poelzam. Каспійскій ремезъ.

*Aegithalus caspius* Poelzam, Протоколы Казанск. Общ. Естеств., I, 141 (1870).

*Aegithalus caspius* Богдановъ, Пт. Кавк., 91.

*Aegithalus pendulinus et var. castaneus* = *caspius* Радде, *Ornis Caucas.*, 114.

*Aegithalus castaneus* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 844; Loudon, *Reise*, 24.

*Anthoscopus pendulinus caspius* Сатунинъ, Матеріалы, 42; Hartert, I, 390.

Восточная, прикаспійская часть всего края. Въ Закавказьѣ на западъ констатированъ до Тифлиса.

Въ западномъ Закавказьѣ ремезъ вообще не найденъ.

### *Regulus Vieill.* 1807.

126. *Regulus regulus regulus* L. Желтоголовый королекъ.

*Motacilla Regulus* Linneé, *Syst. Nat.* Ed. X, p. 188 (1758).

*Regulus flavicapillus* Богдановъ, Пт. Кавк., 103; Динникъ, Орн. набл., 346; Lorenz, *Beitrag*, 34.

*Regulus cristatus* Радде, *Ornis Caucas.*, 187; Id., *Talysch*, 18; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 849; Вильконскій, Аджарія, 111; *Catal.*, 137; Цвѣтковъ, 91.

*Regulus regulus* Дерюгинъ, Чорохск. кр., 20; Сатунинъ, Матеріалы, 39.

*Regulus regulus regulus* Hartert, I, 394.

Поясъ хвойныхъ лѣсовъ всего края.

127. *Regulus ignicapillus ignicapillus* Temm. Красноголовый королекъ.

*Sylvia ignicapilla* Temminck, *Man. d'Orn.* Ed. II, I, p. 231 (1820).

*Regulus ignicapillus* Мензбирь, Пт. Росс., II, 852;  
Вильконский, Аджарія, 110.

*Regulus ignicapilla ignicapilla* Hartert, I, 398.

Западное Закавказье.

### **Panurus Koch 1816.**

128. *Panurus biarmicus russicus* Brehm. Усатая синица.

*Mystacinus Russicus* Brehm, Handb. Naturg. Vög. Deutschl., p: 472 (1831).

*Calamophilus barbatus* Богдановъ, Пт. Кавк., 90;  
Радде, Orn. Caucas., 114; Id., Talysch, 15.

*Panurus barbatus* Мензбирь, Пт. Росс., II, 845.

*Panurus biarmicus* Catal., 146.

*Panurus biarmicus russicus* Сатунинъ, Матеріалы, 42; Hartert, I, 405; Loudon, Reise, 24.

Все каспійское побережье, устье Кубани (Плеске in litt.).

### **Fam. Laniidae.**

#### **Lanius Linné 1758.**

129. *Lanius minor* Gm. Чернолобый сорокопуть.

*Lanius minor* Gmelin, Syst. Nat., I, p. 308 (1788).

*Lanius minor* Богдановъ, Пт. Кавк., 85; Вилькевичъ, Дагестанъ, 12; Lorenz, Beitrag, 40; Мензбирь, Пт. Росс., II, 723; Вильконский, Аджарія, 117; Цвѣтковъ, 87; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 20; Сатунинъ, Матеріалы, 44; Кобылинъ, Матеріалы, 37; Hartert, I, 416; Radde, Talysch, 20.

*Lanius minor* et var. *obscurior* Радде, Orn. Caucas., 222; Catal., 161.

Весь край.

130. *Lanius excubitor excubitor* L. Большой сорокопуть.

*Lanius Excubitor* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 94 (1758).

*Lanius excubitor* Богдановъ, Пт. Росс., 85; Радде, Orn. Caucas., 217; Россиковъ, Дол. Малки, 42; Lorenz, Beitrag,

39; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 728; Вильконскій, Аджарія, 117; Цвѣтковъ, 88; Сатунинъ, Матеріалы, 44; Кобылинъ, Матеріалы, 37; London, Reise, 35.

*Lanius excubitor* typ. Radde, Talysch, 20; Catal., 162.

*Lanius excubitor excubitor* Hartert, I, 418.

*Lanius* *gарах* Catal., 162.

Только зимою какъ на Сѣверномъ Кавказѣ, такъ и въ Закавказьѣ.

131. *Lanius excubitor homeyeri* Cab.

*Lanius Homeyeri* Cabanis, Journ. f. Orn., 1873, p. 75.

*Lanius Homeyeri* Богдановъ, Пт. Кавк., 85; Lorenz, Beitrag, 39; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 731.

*Lanius excubitor* var. *Homeyeri* Радде, Orn. Caucas., 217; Id., Talysch, 20.

*Lanius excubitor homeyeri* Hartert, I, 420; Catal., 162.

Также залетаетъ только зимою.

132. *Lanius excubitor pallidirostris* Cass.

*Lanius pallidirostris* Cassin, Proc. Acad. Philad., V, p. 244 (1852).

*Lanius lathora* Радде, Orn. Caucas., 221; Id., Talysch, 20.

*Lanius grimmi* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 727; Catal., 162.

*Lanius excubitor pallidirostris* Hartert, I, 429.

Радде добылъ однажды зимою у Ленкорани сорокопуга, котораго опредѣлилъ какъ *L. lathora*. По мнѣнію проф. Мензбира, это ни въ какомъ случаѣ не *L. lathora*, а, вѣроятно, *L. Grimmi*. Hartert же редуцировалъ *L. Grimmi* къ *L. e. pallidirostris*.

133. *Lanius senator senator* L. Красноголовый сорокопугъ.

*Lanius Senator* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 94 (1758);

- Phoneus ruficeps* Богдановъ, Пт. Кавк., 85.  
*Lanius ruficeps* Радде, Orn. Caucas., 223; Id., Talysch, 20.  
*Lanius rufus* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 715; Цвѣтковъ,  
 87; Catal., 160.  
*Lanius senator* Сатунинъ, Матеріалы, 44.  
*Lanius senator senator* Hartert, I, 434.  
 Восточное Закавказье.

### *Enneactonotus* Boie 1826.

#### 134. *Enneactonotus collurio collurio* L.

- Lanius Collurio* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 94  
 (1758).  
*Lanius collurio* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 717; Hartert,  
 I, 439.  
*Enneactonotus collurio* Сатунинъ, Матеріалы, 43.  
 Степи Севернаго Кавказа.

#### 135. *Enneactonotus collurio kobylini* Buturlin.

- Enneactonotus collurio kobylini* Buturlin, Ibis,  
 1906, p. 416.  
*Enneactonotus collurio* Богдановъ, Пт. Кавк., 84; Де-  
 рюгинъ, Чорохск. кр., 20; Lorenz, Beitrag, 40.  
*Lanius collurio* Радде, Orn. Caucas., 222; Id., Talysch,  
 20; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 717; Вильконскій, Аджарія, 118;  
 Цвѣтковъ, 87; Catal., 159.  
*Lanius collurio kobylini* Бутурлинъ, Сборъ Кобы-  
 лина, 7; Hartert, I, 441.  
*Enneactonotus collurio kobylini* Сатунинъ, Мате-  
 ріалы, 43; Кобылинъ, Матеріалы, 37.  
 Весь край.

### Fam. *Ampelidae*.

#### *Bombycilla* Vieillot 1807.

#### 136. *Bombycilla garrula garrula* L.

- Lanius Garrulus* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 95  
 (1758).

*Bombusilla garrula* Радде, *Ornis Caucas.*, 216; *Id.*, *Talysch*, 20; Динникъ, *Орн. набл.*, 351; Сатунинъ, *Матеріалы*, 44; *Catal.*, 163.

*Ampelis garrulus* Мензбиръ, *Пт. Росс.*, II, 708.

*Bombusilla garrulus garrulus* Hartert, I, 456.

Зимою залетаетъ въ Закавказье.

### Fam. Muscicapidae.

*Muscicapa* L. 1766 (Ex Brisson).

137. *Muscicapa striata striata* Pall. Страя мухоловка.

*Motacilla striata* Pallas, *Vroeg's Catal. Verzam. Vogelen, dieren, Adumbratiuncula*, p. 3 (1764).

*Butalis grisola* Богдановъ, *Пт. Кавк.*, 83; Radde, *Talysch*, 20; *Id.*, *Ornis Caucas.*, 224; Lorenz, *Beitrag*, 41.

*Muscicapa grisola* Мензбиръ, *Пт. Росс.*, II, 704; Вильконскій, *Аджарія*, 118; *Catal.*, 164; Цвѣтковъ, 87; Дерюгинъ, *Чорохск. кр.*, 27.

*Muscicapa striata* Сатунинъ, *Матеріалы*, 69; Кобылинъ, *Матеріалы*, 33.

*Muscicapa striata striata* Hartert, I, 475.

Гнѣздящаяся птица всего края.

*Hedymela* Sundev. 1846.

138. *Hedymela atricapilla atricapilla* L. Мухоловка пеструшка.

*Muscicapa atricapilla* Linné, *Syst. Nat. Ed. XII*, p. 326 (1766).

*Muscicapa atricapilla* Богдановъ, *Пт. Кавк.*, 83; Radde, *Talysch*, 20; *Id.*, *Ornis Caucas.*, 225; Мензбиръ, *Пт. Росс.*, II, 701.

*Muscicapa atricapilla atricapilla* Hartert, I, 480.

Массовый пролетъ наблюдался Радде по каспійскому побережью (Ленкорань), но въ Кавказскомъ Музеѣ нѣтъ ни одного экземпляра, такъ что является сомнѣніе въ правильности опредѣленія Радде. Можетъ быть, это относится къ слѣдующему подвиду.

139. *Hedymela atricapilla semitorquata* Hom. Кавказская мухоловка  
бѣлошейка.

*Muscicapa semitorquata* E. v. Homeyer, Zeitschr. Ges. Orn., II, p. 185, Taf. X (1885).

*Muscicapa collaris* Богдановъ, Пт. Кавк., 83; Id., Orn. Caucas., 226.

*Muscicapa semitorquata* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 699; Вильконскій, Аджарія, 118; Catal., 163; Цвѣтковъ, 86.

? *Muscicapa atricapilla* Radde, Talysch, 20 (partim!).

*Hedymela semitorquata* Сатунинъ, Матеріалы, 68.

*Muscicapa atricapilla semitorquata* Hartert, I, 483.

Рѣдная гнѣздящаяся птица лѣсного пояса.

*Siphia* Hodgs. 1837.

140. *Siphia parva parva* Bechst. Малая мухоловка.

*Muscicapa parva* Bechstein, Latham's allg. Uebers. d. Vögel, II, p. 356 (1794).

*Erythrostera parva* Богдановъ, Пт. Кавк., 84; Radde, Talysch, 20; Id., Orn. Caucas., 224; Lorenz, Beitrag, 41; Catal., 163.

*Muscicapa parva* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 693; Вильконскій, Аджарія, 119; Цвѣтковъ, 86.

*Siphia parva* Сатунинъ, Матеріалы, 67.

*Muscicapa parva parva* Hartert, 485.

Весь край.

## Fam. Sylviidae.

*Phylloscopus* Boie 1826.

141. *Phylloscopus collybita abietina* Nilss. Пѣночка кузнечикъ, теньковка.

*Sylvia abietina* Nilsson, Kgl. Vet.-Akad. Handl., 1819, p. 115.

*Phylloscopus rufa* Богдановъ, Пт. Кавк., 103; Lorenz, Beitrag, 28.

*Phylloscopus rufus* Radde, Talysch, 18; Плеске \*, Ornithogr., 251; Дерюгинъ, Чорохскій кр., 23; Catal., 138.

*Phylloscopus rufus* typ. et var. *obscurus* Радде, Orn. Caucas., 183.

*Phylloscopus collybita* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 931; Вильконскій, Аджарія, 111; Цвѣтковъ, 93; Сатунинъ, Матеріалы, 49.

*Phylloscopus collybita abietina* Hartert, I, 503.

Весь край.

142. *Phylloscopus neglectus lorenzi* Menzbier. Кавказская пѣночка.

*Phyllopneuste Lorenzii* Menzbier, in Lorenz, Beitr. z. Kenntn. Orn. Fauna Nords. Kaukasus, p. 28, Taf. II, 2, 3 u. 4 (1887).

*Phyllopneuste tristis* Богдановъ, Пт. Кавк., 103.

*Phylloscopus tristis* Радде, Orn. Caucas., 185; Catal., 139.

*Phylloscopus sindianus* Плеске, Ornithogr., 284; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 937; Вильконскій, Аджарія, 111; Catal., 139.

*Phylloscopus Lorenzi* Сатунинъ, Матеріалы, 49.

*Phylloscopus neglectus lorenzi* Hartert, I, 506.

Весь край.

143. *Phylloscopus trochilus trochilus* L. Пѣночка весничка.

*Motacilla Trochilus* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 188 (1758).

*Phyllopneuste trochilus* Богдановъ, Пт. Кавк., 102; Lorenz, Beitrag, 28; Вильконскій, Аджарія, 112.

*Phylloscopus Trochilus* Радде, Orn. Caucas., 184; Id., Talysch, 18.

*Phylloscopus trochilus* Плеске, Ornithogr., 218; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 926; Catal., 137; Цвѣтковъ, 94; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 23; Сатунинъ, Матеріалы, 49; Кобылинъ, Матеріалы, 36; Loudon, Reise, 18.

\* О. Д. Плеске. Ornithographia Rossica. Орнитологическая фауна Россійской Имперіи. Т. II. Sylviinae. СПб. 1889—1891.

*Phylloscopus trochilus trochilus* Hartert, I, 507.

На пролетъ во всемъ краѣ.

144. *Phylloscopus nitidus nitidus* Blyth. Желтобрюхая пѣночка.

*Phylloscopus nitidus* Blyth, Journ. As. Soc. Bengal, XII, p. 965 (1843).

? *Phylloscopus plumbeitarsus* Радде, Orn. Caucas., 185.

*Phylloscopus viridanus* Вилькевичъ, Дагестанъ, 11.

*Phylloscopus nitidus* Lorenz, Beitrag, p. 29, Taf. II, 1; Плеске, Ornithogr., 172; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 916; Вильконскій, Аджарія, 111; Catal., 140; Цвѣтковъ, 93; Сатунинъ, Матеріалы, 48.

*Acanthopneuste nitidus* Дерюгинъ, Чорохск. кр., 22.

*Phylloscopus nitidus nitidus* Hartert, I, 510.

Весь край.

145. ? *Phylloscopus bonelli orientalis* Brehm. Пѣночка бѣлобрюхая.

*Phyllopneuste orientalis* Brehm, Vogelfang, p. 332 (1855).

*Phylloscopus Bonellii* Плеске, Ornithogr., 246; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 930.

*Phylloscopus bonelli orientalis* Hartert, I, 514.

Эта пѣночка свойственна побережью Средиземнаго моря. А такъ какъ, съ одной стороны, она гнѣздится въ Малой Азіи, а съ другой, была найдена на южномъ берегу Крыма, то проф. М. А. Мензбиръ предполагаетъ, что, можетъ быть, она гнѣздится и гдѣ нибудь по черноморскому побережью Кавказа.

146. *Phylloscopus sibilatrix sibilatrix* Bechst. Пѣночка желтобрювая.

*Motacilla Sibilatrix* Bechstein, Naturforscher, XXVII, p. 47 (1793).

*Phyllopneuste sibilatrix* Богдановъ, Пт. Кавк., 103.

*Phylloscopus sibilatrix* Радде, Orn. Caucas., 183; Id., Talysch, 18; Плеске, Ornithogr., 200; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 922.

*Phylloscopus sibilatrix sibilatrix* Hartert, I, 515.

Съ достовѣрностью найдена только на пролетѣ, но, можетъ быть, и гнѣздится въ западномъ Закавказьѣ. По Hartert'у, эта предположительно гнѣздящаяся форма можетъ относиться не къ типичной формѣ, а къ *Ph. sibilatrix erlan-geri* Hartert, живущей въ средиземноморской области.

### *Cettia* Bp. 1838.

147. *Cettia cetti cetti* Marm. Соловьиная камышовка.

*Sylvia Cetti* Marmora, Mem. Accad. Torino, XXX, p. 254 (1820).

*Cettia sericea* Богдановъ, Пт. Кавк., 102.

*Cettia Cettii* Радде, Orn. Caucas., 181; Id., Talysch, 18; Плеске, Ornithogr., 634.

*Cettia cetti* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 857; Сатунинъ, Матеріалы, 53; Catal., 144; Loudon, Reise, 20.

*Cettia cetti cetti* Hartert, I, 537.

Восточное Закавказье, но найдена и въ центральномъ (Ахалцихъ) до 3000'.

### *Lusciniola* Gray 1841.

148. *Lusciniola melanorogon melanorogon* Temm. Тонкоклювая камышовка.

*Sylvia melanorogon* Temminck, Pl. Col., 245, Fig. 2 (1823).

*Calamodyta melanorogon* Богдановъ, Пт. Кавк., 101.

*Lusciniola melanorogon* Радде, Orn. Caucas., 180; Id., Talysch, 18; Плеске, Ornithogr., 426; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 876; Catal., 144.

*Lusciniola melanorogon melanorogon* Hartert, I, 540.

Довольно рѣдкая птица всего края.

**Locustella** Kaup. 1829.149. *Locustella fluviatilis* Wolf. Рѣчная камышовка.

*Sylvia fluviatilis* Wolf, Meyer & Wolfs Taschenb. d. deutsch. Vögelkunde, I, p. 229 (1810).

*Locustella fluviatilis* Радде, *Ornis Caucas.*, 181; Плеске, *Ornithogr.*, 568; Мензбирь, *Пт. Росс.*, II, 861; *Catal.*, 143; Hartert, I, 547.

*Calamocherpe fluviatilis* Lorenz, *Beitrag*, 31.

Только на пролетѣ.

150. *Locustella naevia straminea* Seeb.

*Locustella straminea* Seebohm, *Cat. B. Brit. Mus.*, V, p. 117 (1881).

*Salicaria locustella* Динникъ, *Орн. набл.*, 346.

*Locustella naevia* Radde, *Talysch*, 18; Lorenz, *Beitrag*, 31; Россиковъ, *СВ. Кавк.*, 49.

*Locustella straminea* Мензбирь, *Пт. Росс.*, II, 868; Цвѣтковъ, 91.

*Locustella locustella* Плеске, *Ornithogr.*, 606.

*Locustella locustella straminea* *Catal.*, 143.

*Locustella naevia straminea* Hartert, I, 553.

Весь край.

**Acrocephalus** Naum. 1811.151. *Acrocephalus arundinaceus arundinaceus* L. Дроздовидная камышовка.

*Turdus arundinaceus* Linné, *Syst. Nat. Ed. X*, p. 170 (1758).

*Salicaria turdoides* Богдановъ, *Пт. Кавк.*, 100; Россиковъ, *СВ. Кавк.*, 55.

*Acrocephalus turdoides* et var. *minor* Радде, *Ornis Caucas.*, 179; Id., *Talysch*, 18.

*Acrocephalus turdoides* Lorenz, *Beitrag*, 30; Плеске, *Ornithogr.*, 473; Мензбирь, *Пт. Росс.*, II, 887; Вильконскій, *Ад-жарія*, 109; Сатунинъ, *Матеріалы*, 51; *Catal.*, 142.

*Acrocephalus arundinaceus arundinaceus* Hartert, I, 556.

Весь край.

152. *Acrocephalus streperus streperus* Vieill. Камышовка тростниковая.

*Sylvia strepera* Vieillot, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., Nouv. Ed., XI, p. 182 (1817).

*Calamocherpe arundinacea* Богдановъ, Пт. Кавк., 101.

*Acrocephalus streperus* Радде, Orn. Caucas., 178; Id., Talysch, 18; Россиковъ, СВ. Кавк., 55; Плеске, Ornithogr., 521; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 896; Вильконскій, Аджарія, 110; Сатунинъ, Матеріалы, 52; Catal., 142.

*Acrocephalus strepera strepera* Hartert, I, 560.

Весь край.

153. *Acrocephalus palustris* Bechst. Болотная камышовка.

*Sylvia palustris* Bechstein, Gemeinn. Naturg. Deutschl., IV, p. 669, Taf. 25 (1795).

*Calamocherpe palustris* Богдановъ, Пт. Кавк., 101.

*Acrocephalus palustris* Радде, Orn. Caucas., 180; Id., Talysch, 18; Россиковъ, СВ. Кавк., 49; Плеске, Ornithogr., 503; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 893; Вильконскій, Аджарія, 110; Catal., 142; Цвѣтковъ, 92; Сатунинъ, Матеріалы, 52; Hartert, I, 562.

*Salicaria palustris* Lorenz, Beitrag, 31.

Весь край.

154. ? *Acrocephalus agricola agricola* Jerd. Индійская камышовка.

*Sylvia (Acrocephalus) agricola* Jerdon, Madras Journ. Lit. & Sc., XIII, no. 31, p. 131 (1845).

*Acrocephalus agricola* Плеске, Ornithogr., 552; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 891.

*Acrocephalus agricola agricola* Hartert, I, 564.

Вѣроятно, будетъ найдена на Сѣверномъ Кавказѣ, такъ какъ гнѣздится на Таврическомъ полуостровѣ и широко распространена въ урало-киргизской области.

155. *Acrocephalus schoenobaenus* L. Камышовка барсучокъ.

*Motacilla Schoenobaenus* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 184 (1758).

*Calamodyta phragmitis* Богдановъ, Пт. Кавк., 101; Динникъ, Орн. набл., 346; Россиковъ, Сб. Кавк., 49.

*Acrocephalus schoenobaenus* Радде, Orn. Caucas., 178; Id., Talysch, 18.

*Salicaria phragmitis* Lorenz, Beitrag, 31.

*Acrocephalus phragmitis* Плеске, Ornithogr., 440; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 880; Вильковский, Аджарія, 110; Catal., 143; Цвѣтковъ, 92; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 20; Сатунинъ, Матеріалы, 51.

*Acrocephalus schoenobaenus* Hartert, I, 566.

Обыкновенна во всемъ краѣ.

*Hippolais* Brehm 1828.156. *Hippolais icterina* Vieill. Лѣсная малиновка.

*Sylvia icterina* Vieillot, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., 2 Ed., XI, p. 185 (1817).

*Hippolais icterina* Lorenz, Beitrag, 30; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 903; Сатунинъ, Распространеніе, 4; Catal., 140; Сатунинъ, Матеріалы, 50.

*Phylloscopus polyglotta* Radde, Talysch, 18.

*Hippolais icterina* Плеске, Ornithogr., 321.

*Hippolais icterina* Hartert, I, 570.

Сѣверный Кавказъ (Кисловодскъ), Денкорань.

157. *Hippolais pallida pallida* Hempr. & Ehrenb. Блѣдная малиновка.

*Curruca pallida* et var. *Andromeda* et *maxillaris* Hemprich & Ehrenberg, Symb. Phys., fol. bb (1833).

*Hippolais pallida* Богдановъ, Пт. Кавк., 102; Радде, Orn. Caucas., 185; Id., Talysch, 18; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 909; Сатунинъ, Распространеніе, 4; Catal., 140.

*Hippolais (Iduna) pallida* Плеске, Ornithogr., 351.

*Iduna pallida* Сатунинъ, Матеріалы, 50.

*Hippolais pallida pallida* Hartert, I, 574.

Восточное Закавказье, каспійское побережье.

158. *Hippolais caligata* Licht. Бормотушка.

*Sylvia caligata* Lichtenstein, in Eversmann's Reise von Orenburg nach Buchara, p. 128 (1823).

*Hypolais caligata* Радде, Orn. Caucas., 187; Id., Talysch, 18; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 907; Catal., 140.

*Hypolais (Iduna) caligata* Плеске, Ornithogr., 367.

*Iduna caligata* Сатунинъ, Матеріалы, 50.

*Hippolais caligata* Hartert, I, 575.

На пролетъ по каспійскому побережью.

*Sylvia Scopoli* 1769.159. *Sylvia nisoria nisoria* Bechst. Ястребиная славка.

*Motacilla nisoria* Bechstein, Gem. Naturg. Deutschl., IV, p. 580 (1795).

*Adophoneus nisorius* Богдановъ, Пт. Кавк., 103.

*Sylvia nisoria* Радде, Orn. Caucas., 187; Lorenz, Beitrag, 27; Плеске, Ornithogr., 1; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 946; Сатунинъ, Распространеніе, 3; Catal., 134; Цвѣтковъ, 94; Сатунинъ, Матеріалы, 46.

*Sylvia nisoria nisoria* Hartert, I, 578.

Весь край, чаще въ восточномъ Закавказьѣ.

160. *Sylvia orphea crassirostris* Cretzschm. Масличная славка.

*Sylvia crassirostris* Cretzschmar, Atlas Reise Rüppells, p. 49, Taf. 33, Fig. a (1826).

*Sylvia orphea* Плеске, Ornithogr., 64; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 958; Цвѣтковъ, 95; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 21.

*Sylvia hortensis crassirostris* Hartert, I, 581.

Закавказье.

161. *Sylvia hortensis hortensis* Lath. Садовая славка.

*Sylvia hortensis* Latham, Ind. Ornithol., II, p. 507 (1790).

*Sylvia hortensis* Богдановъ, Пт. Кавк., 104; Радде, Orn. Caucas., 189; Lorenz, Beitrag, 27; Плеске, Ornithogr., 43;

Мензбирь, Пт. Росс., II, 955; Вильконский, Аджарія, 113; Catal., 134; Цвѣтковъ, 95; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 21; Сатунинъ, Матеріалы, 46.

*Sylvia borin borin* Hartert, I, 582.

Нижняя полоса лѣса.

162. *Sylvia atricapilla atricapilla* L. Черноголовка.

*Motacilla Atricapilla* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 187 (1758).

*Sylvia atricapilla* Богдановъ, Пт. Кавк., 104; Радде, Orn. Caucas., 190; Id., Talysch, 18; Lorenz, Beitrag, 27; Россииковъ, СВ. Кавк., 50; Плеске, Ornithogr., 115; Мензбирь, Пт. Росс., II, 966; Вильконский, Аджарія, 112; Catal., 136; Цвѣтковъ, 96; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 21; Сатунинъ, Матеріалы, 48; Кобылинъ, Матеріалы, 36.

*Sylvia atricapilla atricapilla* Hartert, I, 583.

Нижняя полоса лѣса.

163. *Sylvia communis communis* Lath. Сѣрая славка.

*Sylvia communis* Latham, Gen. Syn., Suppl. I, p. 287 (1787).

*Sylvia cinerea* Плеске, Ornithogr., 17; Мензбирь, Пт. Росс., II, 950.

*Sylvia cinerea* typ. Radde, Talysch, 18.

*Sylvia communis communis* Hartert, I, 586.

Вѣроятно, встрѣчается на пролетѣ.

164. *Sylvia communis icterops* Ménétr. Восточная сѣрая славка.

*Sylvia icterops* Ménétries, Cat. rais. Caucase, p. 34 (1832).

*Sylvia cinerea* Богдановъ, Пт. Кавк., 104; Lorenz, Beitrag, 27; Вильконский, Аджарія, 113; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 21.

*Sylvia cinerea* et *S. c. fuscipilea* Catal., 135.

*Sylvia cinerea* et var. *persica* Радде, Orn. Caucas., 188; Id., Talysch, 18.

*Sylvia cinerea* var. *fuscipilea* Плеске, Ornithogr., 18; Мензбирь, Пт. Росс., II, 950; Цвѣтковъ, 94.

*Sylvia cinerea fuscipilea* Сатунинъ, Матеріалы, 46.  
*Sylvia communis icterops* Hartert, I, 587.

Весь край до 6000'.

Часть вышеприведенной литературы, можетъ быть, относится и къ предыдущей формѣ.

165. *Sylvia curruca curruca* L. Славка завирушка.

*Motacilla Curruca* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 184 (1758).

*Sylvia curruca* Богдановъ, Пт. Кавк., 104; Радде, *Ornis Caucas.*, 188; Id., Talysch, 18; Плеске, *Ornithogr.*, 75; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 960; Вильконскій, Аджарія, 112; Catal., 135; Цвѣтковъ, 96; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 22; Сатунинъ, Матеріалы, 46; Кобылинъ, Матеріалы, 36.

*Sylvia curruca affinis* Вильконскій, Аджарія, 112.

*Sylvia curruca curruca* Hartert, I, 588.

Нижняя лѣсная полоса до 5000'.

165, a. *Sylvia caucasica* Ognev & Banjkowskij. Кавказская славка.

*Sylvia caucasica* Огневъ С. И. и Баньковскій В. Б., Ежегодн. Зоолог. Муз. И. Акад. Наукъ, XV, 237 (1910).

Описаніе этой новой славки появилось уже во время печатанія настоящей работы. Вѣроятно, многіе прежніе изслѣдователи смѣшивали ее съ предыдущимъ видомъ. Мцхетъ.

166. *Sylvia mystacea* Ménétr. Бѣлоусая славка.

*Sylvia mystacea* Ménétries, Cat. Rais. Caucas., p. 34 (1832).

*Sylvia mystacea* Богдановъ, Пт. Кавк., 105; Радде, *Ornis Caucas.*, 190; Id., Talysch, 18; Плеске, *Ornithogr.*, 106; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 964; Сатунинъ, Распространеніе, 3; Catal., 135; Сатунинъ, Матеріалы, 47; Hartert, I, 595.

Восточное Закавказье и каспійское побережье (до сѣверной границы Багинской губ.).

167. *Sylvia nana nana* Hempr. & Ehrenb. Пустынная славка.

*Currusa nana* Hemprich & Ehrenberg, Symb. Phys., fol. cc (1833).

*Sylvia nana* Бутурлинъ, Наша Охота, 1908, окт., 2.

Однажды въ октябрѣ добыта у Ленкорани.

### *Agrobates* Swains 1838.

168. *Agrobates galactotes familiaris* Ménétr. Краснохвостка.

*Sylvia familiaris* Ménétries, Cat. Rais. Caucase, p. 32 (1832).

*Aëdon familiaris* Богдановъ, Пт. Кавк., 100; Плеске, Ornithogr., 974; Catal., 144; Сатуининъ, Матеріалы, 44.

*Aëdon galactotes* Радде, Orn. Caucas., 182; Id., Talysch, 18.

*Sylvia familiaris* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 974; Сатуининъ, Распространеніе, 2.

*Agrobates galactotes familiaris* Hartert, I, 605.

Восточное Закавказье и каспійское побережье.

### Fam. Turdidae.

#### *Turdus* L. 1758.

169. *Turdus pilaris* L. Дроздъ рябинникъ.

*Turdus pilaris* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 168 (1758).

*Turdus pilaris* Богдановъ, Пт. Кавк., 80; Радде, Orn. Caucas., 212; Id., Talysch, 19; Россиковъ, Дол. Малки, 36; Динникъ, Орн. набл., 340; Lorenz, Beitrag, 19; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 1079; Вильконскій, Аджарія, 109; Catal., 123; Цвѣтковъ, 102; Сатуининъ, Матеріалы, 62; Кобылинъ, Матеріалы, 33; Hartert, I, 646; Loudon, Reise, 1.

Только на пролетѣ.

170. *Turdus viscivorus viscivorus* L. Дроздь дѣряба.

*Turdus viscivorus* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 168 (1758).

*Turdus viscivorus* Богдановъ, Пт. Кавк., 78; Радде, Orn. Caucas., 211; Id., Talysch, 19; Динникъ, Орн. набл., 338; Lorenz, Beitrag, 19; Билькевичъ, Дагестанъ, 8; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 1068; Вильконскій, Аджарія, 108; Catal., 122; Цвѣтковъ, 102; Сатунинъ, Матеріалы, 63.

*Turdus viscivorus viscivorus* Hartert, I, 647.

Поясъ хвойнаго лѣса.

171. ? *Turdus viscivorus bonapartei* Homeyer.

*Turdus Bonapartei* Cabanis, Journ. f. Orn., 1860, p. 183.

*Turdus viscivorus* var. *hodgsoni* oder *bonapartei* London, Reise, 1.

Ленкоранск. у., зимою (Лоудонъ).

172. *Turdus viscivorus hodgsoni* Homeyer.

*Turdus Hodgsoni* Homeyer, „Rhea“, II, p. 150 (1849).

*Turdus viscivorus hodgsoni* London, Reise, 1.

Ленкоранск. у., зимою (Лоудонъ). Хотя экземпляръ, добытый Лоудономъ у Кумбаши, не могъ быть съ точностью отнесенъ ни къ *hodgsoni*, ни къ *bonapartei*, онъ не сомнѣвается, что здѣсь находятся мѣста зимовки обѣихъ формъ.

173. *Turdus musicus musicus* L. Пѣвчій дроздь.

*Turdus musicus* Linné, Syst. Nat. Ed. XII, p. 292 (1766).

*Turdus musicus* Богдановъ, Пт. Кавк., 78; Радде, Orn. Caucas., 209; Id., Talysch, 19; Россиковъ, Дол. Малки, 42; Динникъ, Орн. набл., 339; Lorenz, Beitrag, 19; Мензбиръ, Пт. Росс., 1073; Вильконскій, Аджарія, 107; Catal., 122; Цвѣтковъ, 102;

Дерюгинъ, Чорохск. кр., 23; Сатунинъ, Матеріалы, 62; Кобылинъ, Матеріалы, 34; Loudon, Reise, 1.

*Turdus philomelos philomelos* Hartert, I, 650.

Лѣсной поясъ.

174. *Turdus iliacus* L. Дроздъ бѣлобровикъ.

*Turdus iliacus* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 169 (1758).

*Turdus iliacus* Богдановъ, Пт. Кавк., 79; Радде, Orn. Caucas., 210; Id., Talysch., 19; Динникъ, Орн. набл., 339; Lorenz, Beitrag, 19; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 1076; Вильконскій, Аджарія, 107; Catal., 122; Цвѣтковъ, 102; Сатунинъ, Матеріалы, 62.

! *Turdus musicus* Hartert, I, 653.

Зимуесть въ Закавказьѣ.

175. *Merula ruficollis atrogularis* Temm. Чернозобый дроздъ.

*Turdus atrogularis* Temminck, Man. d'Orn., II, p. 169 (1820).

*Turdus atrigularis* Радде, Orn. Caucas., 210; Id., Talysch., 19; Catal., 123.

*Merula atrigularis* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 1066; Цвѣтковъ, 101.

Найдень на пролетъ въ Закавказьѣ (Бѣлый Ключъ, Ленкорань).

*Merula* Leach 1816.

176. *Merula torquata orientalis* Seeb. Бѣлозобый дроздъ.

*Merula torquata orientalis* Seebohm, Ibis, 1888, p. 311.

*Merula torquata* Богдановъ, Пт. Кавк., 80; Динникъ, Орн. набл., 341; Lorenz, Beitrag, 19; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 1057; Цвѣтковъ, 101; Сатунинъ, Матеріалы, 64.

*Turdus torquatus* Радде, Orn. Caucas., 212; Id., Talysch., 19; Билькевичъ, Дагестанъ, 8; Catal., 124.

*Turdus torquatus alpestris* Вильконскій, Аджарія, 108.

*Turdus torquatus orientalis* Hartert, I, 664.

Верхний поясъ лѣса и альпійская область.

177. *Merula merula merula* L. Черный дроздь.

*Turdus Merula* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 170 (1758).

*Turdus merula merula* Hartert, I, 665.

178. *Merula merula aterrima* Mad.

*Merula aterrima* Madarász, Ornith. Monatsber., XI, p. 186 (1903).

*Turdus merula aterrima* Hartert, I, 669.

*Merula vulgaris* Богдановъ, Пт. Кавк., 80; Россиковъ, Дол. Малки, 42; Динникъ, Орн. набл., 341; Lorenz, Beitrag, 19.

*Turdus merula* Радде, Ornith. Caucas., 214; Id., Talysch, 19; Билькевичъ, Дагестанъ, 8; Вильконскій, Аджарія, 107; Catal., 124.

*Merula merula* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 1061; Цвѣтковъ, 101; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 23; Сатунинъ, Матеріалы, 63; Кобылинъ, Матеріалы, 34.

*Turdus merula aterrima* Hartert, I, 669.

*M. m. aterrima* является мѣстной осѣдлою формой, типичная же бываетъ, вѣроятно, только зимою.

Предгорья и лѣсной поясъ всего края; зимою на низменности.

### *Monticola* Boie 1822.

179. *Monticola saxatilis* L. Пестрый каменный дроздь.

*Turdus saxatilis* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 294 (1766).

*Petrocincla saxatilis* Богдановъ, Пт. Кавк., 81; Радде, *Ornis Caucas.*, 201; Id., *Talysch*, 19; Динникъ, Орн. набл., 342; Lorenz, *Beitrag*, 20.

*Monticola saxatilis* Билькевичъ, Дагестанъ, 10; Мензбиръ, Пт. Кавк., II, 1053; Сагунинъ, Матеріалы, 64; Hartert, I, 671; *Catal.*, 124.

Горная область всего края до 9000'.

180. *Monticola cyaneus cyaneus* L. Синій каменный дроздъ.

*Turdus Cyaneus* Linné, *Syst. Nat. Ed. XII*, p. 296 (1766).

*Monticola cyana* Богдановъ, Пт. Кавк., 81; Билькевичъ, Дагестанъ, 8; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 1055; Сагунинъ, Матеріалы, 65; *Catal.*, 124.

*Petrocossyphus cyaneus* Радде, *Ornis Caucas.*, 202.

*Petrophila cyaneus* Дерюгинъ, Чорохск. кр., 23.

*Monticola solitarius solitarius* Hartert, I, 674.

Спорадически по всему краю, но не выше 5000' и гораздо рѣже предыдущаго.

### *Saxicola* Bechst. 1802.

181. *Saxicola oenanthe oenanthe* L. Каменка обыкновенная.

*Motacilla Oenanthe* Linné, *Syst. Nat. Ed. X*, I, p. 186 (1758).

*Saxicola oenanthe oenanthe* Hartert, I, 679.

и 182. *Saxicola oenanthe rostrata* Hempr. & Ehrenb.

*Saxicola rostrata* Hemprich & Ehrenberg, *Symb. Phys.*, I, fol. aa (1833).

*Saxicola oenanthe rostrata* Hartert, I, 681.

*Saxicola oenanthe* Богдановъ, Пт. Кавк., 92; Радде, *Ornis Caucas.*, 203; Id., *Talysch*, 19; Динникъ, Орн. набл., 343; Lorenz, *Beitrag*, 20; Билькевичъ, Дагестанъ, 10; Мензбиръ, Пт.

Росс., II, 1022; Сатунинъ, Распространеніе, 2; Catal., 125; Вильконскій, Аджарія, 116; Цвѣтковъ, 98; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 25; Сатунинъ, Матеріалы, 54; Кобылинъ, Матеріалы, 35.

Обыкновеннѣйшая птица всего края.

Формы эти еще очень недостаточно разграничены. По-видимому, ко второй изъ нихъ принадлежитъ обыкновенная каменка, гнѣздящаяся въ Закавказьѣ.

183. *Saxicola deserti atrogularis* Blyth. Пустынная каменка.

*Saxicola atrogularis* Blyth, Journ. As. Soc. Bengal, 1847, p. 131.

*Saxicola deserti* Радде, Orn. Caucas., 205; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 1030; Сатунинъ, Распространеніе, 1; Catal., 127; Сатунинъ, Матеріалы, 56.

Довольно рѣдкая гнѣздящаяся птица восточнаго Закавказья.

184. *Saxicola hispanica xanthomelaena* Hempr. & Ehrbg. Черноухій чеканъ.

*Saxicola xanthomelaena* Hemprich & Ehrenberg, Symb. Phys. Aves, fol. c, aa, no. 6 (1833).

*Saxicola hispanica xanthomelaena* Hartert, I, 687.

и 185. *Saxicola hispanica gaddi* Sar. & Loud.

*Saxicola gaddi* Sarudny & Loudon, Orn. Jahrb., 1904, p. 219.

*Saxicola hispanica gaddi* Hartert, I, 688.

*Saxicola amphileuca* Богдановъ, Пт. Кавк., 93; Радде, Orn. Caucas., 206; ? Динникъ, Орн. набл., 344; Россиковъ, СВ. Кавк., 54.

*Saxicola aurita* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 1026; Сатунинъ, Распространеніе, 1; Сатунинъ, Матеріалы, 56.

*Saxicola albicollis* Бутурлинъ, Наша Охота, 1909, ноябрь, 89.

Найденъ какъ на Сѣверномъ Кавказѣ, такъ и въ Закавказьѣ, но вездѣ рѣдокъ. Въ Закавказьѣ найдена вторая форма (Hartert). Екъ какой относится сѣверно-кавказскій черноухій чеканъ и встрѣчается ли вообще здѣсь первая форма, еще не выяснено.

186. *Saxicola pleschanka pleschanka* Lerech. Каменка плѣшанка.

*Motacilla Pleschanka* Lerechin, Nov. Comm. Petr., XIV, p. 503, Taf. 24 (1770).

*Saxicola leucomela* Богдановъ, Пт. Кавк., 93; Радде, *Ornis Caucas.*, 205; Россиковъ, СВ. Кавк., 54; Вилькевичъ, Дагестанъ, 10; Catal., 126.

*Saxicola morio* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 1033; Сатунинъ, Матеріалы, 56; Кобылинъ, Матеріалы, 34.

Весь край.

187. *Saxicola pleschanka vittata* Hempr. & Ehrenb.

*Saxicola vittata* Hemprich et Ehrenberg, *Symb. Phys.*, fol. cc (1833).

*Saxicola vittata* Зарудный, Матер. къ познан. фауны и флоры Россійской Имперіи, Отд. Зоол., вып. II, 59 (1896); Сатунинъ, Матеріалы, 57.

*Saxicola pleschanka* (partim) Hartert, I, 688.

Апшеронскій полуостровъ.

188. *Saxicola melanoleuca melanoleuca* Güld. Черноплѣгій чеканъ.

*Muscicapa melanoleuca* Gûldenstädt, Nov. Comm. Petrop., XIX, p. 468, Taf. 15 (1775).

*Saxicola melanoleuca* Богдановъ, Пт. Кавк., 92; Радде, *Ornis Caucas.*, 205; ? Россиковъ, СВ. Кавк., 54; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 1031; Сатунинъ, Распространеніе, 1; Catal., 126;

Цвѣтковъ, 98; Сатунинъ, Матеріалы, 56; Бутурлинъ, Наша Охота, 1909, ноябрь, 89.

Въ Закавказьѣ достовѣрно наблюдался только зимою. Что касается нахожденія его на гнѣздовьяхъ, то, повидимому, здѣсь произошло смѣшеніе его со слѣдующимъ видомъ.

189. *Saxicola melanoleuca finschi* Heugl.

*Saxicola Finschii* Heuglin, Orn. N. O. Afric., I, p. 350 (1869).

*Saxicola erythraea* Богдановъ, Пт. Кавк., 92; Радде, Orn. Caucas., 206; Id., Talysch, 19.

*Saxicola finschi* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 1037; Сатунинъ, Распространеніе, 1; Catal., 127; Сатунинъ, Матеріалы, 56; Бутурлинъ, Наша Охота, 1909, ноябрь, 89.

Восточное и южное Закавказье.

190. *Saxicola isabellina* Cretzschm. Каменка пясунья.

*Saxicola isabellina* Cretzschmar, Atlas zu Rüppells Reise, Vögel, p. 52, Taf. 34, b (1826).

*Saxicola isabellina* Богдановъ, Пт. Кавк., 91; Динникъ, Орн. набл., 344; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 1028; Сатунинъ, Распространеніе, 2; Id., Матеріалы, 55; Кобылинъ, Матеріалы, 35; Catal., 125.

*Saxicola saltator* Радде, Orn. Caucas., 203; Id., Talysch, 19.

Весь край.

191. ? *Saxicola leucurus* Gm. Бѣлохвостая каменка.

*Turdus leucurus* Gmelin, Syst. Nat., I, 2, p. 820 (1789).

*Saxicola leucura* Радде, Orn. Caucas., 206; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 1036.

*Saxicola leucurus leucurus* Hartert, I, 697.

По свидѣтельству Нордманна, этотъ чеканъ былъ найденъ на нижнемъ теченіи Ріона. Никто болѣе этого вида у насъ не находилъ и мнѣ кажется крайне сомнительною точность опредѣленія Нордманна.

*Pratincola* Koch 1816.

192. *Pratincola rubetra noskae* Tsch. Кавказскій луговой чеканъ.

*Pratincola rubetra noskae* Tschusi, Orn. Jahrb., 1902, p. 234.

*Pratincola rubetra* Богдановъ, Пт. Кавк., 94; Радде, Orn. Caucas., 209; Id., Talysch, 19; Динникъ, Орн. набл., 344; Lorenz, Beitrag, 21; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 1017; Вильконскій, Аджарія, 116; Цвѣтковъ, 98; Сатунинъ, Матеріалы, 54; Catal., 128.

*Pratincola rubetra Noskae* Сатунинъ, Изв. Кавк. Отд. Имп. Русск. Географич. Общ., т. XIX, 1908, стр. 261; Кобылинъ, Матеріалы, 36; Hartert, I, 703.

Весь край.

193. *Pratincola torquata rubicola* L.

*Motacilla Rubicola* Linne, Syst. Nat. Ed. XII, p. 332 (1766).

и 194. *Pratincola torquata maura* Pall. Черноголовый чеканъ.

*Motacilla maura* Pallas, Reise d. versch. Prov. Russ. Reiches, II, p. 708 (1773).

*Pratincola rubicola* Богдановъ, Пт. Кавк., 94; Динникъ, Орн. набл., 344; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 1011; Вильконскій, Аджарія, 116; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 25; Сатунинъ, Матеріалы, 53.

*Pratincola rubicola* typ. et var. Радде, Orn. Caucas., 207; Id., Talysch, 19; Catal., 128.

*Pratincola Hemprichi* Lorenz, Beitrag, 21; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 1013; Вильконскій, Аджарія, 116; Кобылинъ, Матеріалы, 36.

*Pratincola maura* Россиковъ, СВ. Кавк., 48; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 1014.

*Pratincola Hemprichii et intermed.* Сатунинъ, Матеріалы, 53.

Существованіе промежуточныхъ формъ дѣлаетъ чрезвычайно труднымъ опредѣленіе этихъ чекановъ. По Hartert'у, гнѣздящаяся форма края принадлежитъ къ *P. t. mauga*. *P. t. rubicola*, вѣроятно, бываетъ только на пролетѣ, если не гнѣздится гдѣ нибудь на Сѣверномъ Кавказѣ.

### *Ruticilla* Brehm 1828.

195. *Ruticilla phoenicura* L. Обыкновенная горихвостка.

*Motacilla Phoenicurus* Linne, Syst. Nat. Ed. X, p. 187 (1758).

*Ruticilla phoenicura* Богдановъ, Пт. Кавк., 95; Радде, *Ornis Caucas.*, 198; Id., *Talysch*, 19; Lorenz, *Beitrag*, 22; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 1001; *Catal.*, 130; Цвѣтковъ, 97; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 25; Сатунинъ, Матеріалы, 57.

*Phoenicurus phoenicurus phoenicurus* Hartert, I, 718.

Я рѣшительно не могу принять измѣненіе *всѣми принятаго* имени „*Ruticilla*“ на *никимъ не употребляемое* „*Phoenicurus*“, хотя оно и старше. Также и то обстоятельство, что обыкновенная и бѣлокрылая горихвостки гнѣздятся почти рядомъ, указываетъ на то, что это нѣчто большее, чѣмъ подвидь (=географическая раса), какъ это думаетъ Hartert.

Весь край.

196. *Ruticilla mesoleuca* Hempr. & Ehrenb. Бѣлокрылая горихвостка.

*Sylvia mesoleuca* Hemprich & Ehrenberg, *Symb. Phys.*, fol. ee (1832).

*Ruticilla mesoleuca* Богдановъ, Пт. Кавк., 95; Радде, *Ornis Caucas.*, 199; Id., *Talysch*, 19; Lorenz, *Beitrag*, 22; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 1005; Вильконскій, Аджарія, 115; *Catal.*, 131;

Цвѣтковъ, 97; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 25; Сатунинъ, Матеріалы, 57.

*Phoenicurus phoenicurus mesoleuca* Hartert, I, 720.

Весь край, но занимаетъ другіе районы, чѣмъ предыдущій видъ.

197. *Ruticilla ochruros ochruros* Gmel. Горихвостка чернушка.

*Motacilla Ochruros* S. G. Gmelin, Reise d. Russland, III, p. 101, Taf. 19, Fig. 3 (1774).

*Ruticilla ochruros* Богдановъ, Пт. Кавк., 96; Радде, *Ornis Caucas.*, 200; Id., Talysch, 19; Динникъ, Орн. набл., 345; Билькевичъ, Дагестанъ, 11; Lorenz, Beitrag, 24; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 1006; Вильконскій, Аджарія, 115; Цвѣтковъ, 97; Сатунинъ, Матеріалы, 58.

*Ruticilla ochrura* Catal., 129.

*Phoenicurus ochruros ochruros* Hartert, I, 722.

Горная область всего края, до 8000'.

198. ? *Ruticilla ochruros gibraltariensis* Gm.

*Motacilla gibraltariensis* Gmelin, Syst. Nat., I, 2, p. 987 (1789).

*Ruticilla tithys* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 1006; Вильконскій, Аджарія, 115; Catal., 130.

*Phoenicurus ochruros gibraltariensis* Hartert, I, 720.

Однажды найдена зимою въ Батумѣ (Вильконскій l. c.).

199. *Ruticilla erythrogastra erythrogastra* Guld. Краснобрюхая горихвостка.

*Motacilla erythrogastra* Guldénstädt, Nov. Comm. Petr., XIX, p. 469, Taf. 16, 17 (1775).

*Ruticilla erythrogastra* Богдановъ, Пт. Кавк., 97; Радде, *Ornis Caucas.*, 201; Lorenz, Beitrag, 22; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 1008; Catal., 129; Сатунинъ, Матеріалы, 59.

*Phoenicurus erythrogastra erythrogastra*  
Hartert, I, 726.

Альпийская область Большого Кавказа. Зимой наблюда-  
лась у Мцхета (Сатунинъ).

*Luscinia* Forster 1817.

200. *Luscinia megarhynchos megarhynchos* Brehm. Западный соловей.

*Luscinia megarhynchos* Brehm, Handb. Na-  
turg. Vög. Deutschl., p. 356 (1831).

*Erithacus luscinia* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 982;  
Вильконский, Аджарія, 113; Цвѣтковъ, 96.

*Luscinia luscinia* Сатунинъ, Распространеніе, 2; Дерю-  
гинъ, Чорохск. кр., 26.

*Daulias luscinia* Сатунинъ, Матеріалы, 59; Catal., 133.

*Philomela megarhynchos* Бутурлинъ, Орн. Вѣстн.,  
1910, 134.

*Luscinia megarhynchos megarhynchos* Hartert,  
I, 733.

Западное Закавказье до Тифлиса.

201. *Luscinia megarhynchos africana* Fischer & Reich. Кавказскій  
соловей.

*Lusciola africana* Fischer & Reichenow,  
Jour. f. Orn., 1884, p. 182.

*Lusciola Hafizi* Богдановъ, Пт. Кавк., 99; Билькевичъ  
Дагестанъ, 11.

*Daulias Hafizi* Радде, Orn. Caucas., 194; Id., Talysch,  
18; Сатунинъ, Матеріалы, 60; Catal., 133.

*Erithacus hafizi* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 983; Виль-  
конский, Аджарія, 114.

*Luscinia Hafizi* Сатунинъ, Распространеніе, 2.

*Philomela transcaucasica* Бутурлинъ, Орн. Вѣстн.,  
1910, 133.

*Luscinia megarhynchos africana* Hartert, I, 735.

Восточное Закавказье.

202. *Luscinia luscinia* L. Восточный соловей.

*Motacilla* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 184 (1758).

*Lusciola philomela* Богдановъ, Пт. Кавк., 101; Дин-никъ, Орн. набл., 345; Россиговъ, СВ. Кавк., 49.

*Daulias philomela* Радде, Orn. Caucas., 193; Catal., 133; Сатунинъ, Матеріалы, 59.

*Lusciola infusata* Lorenz, Beitrag, 21.

*Erithacus philomela* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 978; Вильконскій, Аджарія, 115.

*Philomela luscinia* Бутурлинъ, Орн. Вѣстн., 1910, 132.

*Luscinia philomela* Сатунинъ, Распространеніе, 2.

*Luscinia luscinia* Hartert, I, 736.

Предкавказье, центральное Закавказье.

*Cyanecula* Brehm 1828.203. *Cyanecula svecica svecica* L. Варакушка.

*Motacilla svecica* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 187 (1758).

*Erithacus suecicus* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 985.

*Luscinia svecica svecica* Hartert, I, 745.

204. *Cyanecula svecica pallidogularis* Sar.

*Cyanecula svecica pallidogularis* Sarudny, Зарудный, Матеріалы къ позн. фауны и флоры Россійск. Импер., Отд. Зоолог., III, 171—312 (1897).

*Luscinia svecica pallidogularis* Hartert, I, 747.

*Cyanecula suecica pallidogularis* Сатунинъ, Матеріалы, 60.

205. *Cyanecula svecica cyanecula* Wolf.

*Sylvia cyanecula* Wolf, in Meyer & Wolfs Taschenb. d. deutsch. Vögelk., I, 240 (1810).

*Erithacus leucocyamus* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 985.

*Luscinia svecica cyanecula* Hartert, I, 748.

206. *Cyanecula svecica volgae* Kleinschm.

*Erithacus volgae* Kleinschmidt, Falco, III, no. 2, p. 47 (1907).

*Luscinia svecica volgae* Hartert, I, 749.

207. *Cyanecula svecica magna* Sar. & Loud.

*Cyanecula wolfii magna* Sarudny & Loudon,  
Orn. Jahrb., 1904, p. 225.

*Luscinia svecica magna* Hartert, I, 750.

*Cyanecula coerulescula* Богдановъ, Пт. Кавк., 99.

*Cyanecula suesica coerulescula* et *C. s. Wolfi*  
Catal., 131 и 132.

*Cyanecula suesica* typ. et varts. *caerulecula*  
*Wolfi* Радде, Orn. Caucas., 198; Id., Talysch, 18.

*Cyanecula suesica* Динникъ, Орн. набл., 345; Lorenz, Beitrag, 21; Вильконскій, Аджарія, 115.

На гнѣздовѣ въ Закавказьѣ съ достовѣрностью найдена *C. s. pallidogularis*, а, по Hartert'у, въ Арменіи гнѣздится, вѣроятно, и *C. s. magna*. Остальные формы должны встрѣчаться на пролетѣ. Но все ли онѣ летятъ черезъ нашъ край и какая форма гнѣздится на Сѣверномъ Кавказѣ, пока неизвѣстно.

*Erithacus* Cuvier 1801.

208. *Erithacus rubecula rubecula* L. Зарянка.

*Motacilla Rubecula* Linné, Syst. Nat. Ed. X,  
p. 188 (1758).

*Erythacus rubecula* Россиковъ, Дол. Малки, 45; Id.,  
СВ. Кавк., 47; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 990; Кобылинъ, Материалы, 34.

*Erythacus hyrcanus* Россиковъ, Дол. Малки, 45  
(partim!).

*Dandalus rubecula* Lorenz, Beitrag, 22; London,  
Reise, 14.

Зимою найдена на Сѣверномъ Кавказѣ, а весною въ западномъ Закавказьѣ, но, гнѣздится ли она у насъ гдѣ нибудь, еще не выяснено.

209. *Erithacus rubeculus hyrcanus* Blanf. Персидская зарянка.*Erithacus hyrcanus* Blanford, Ibis, 1874, p. 79.*Erithacus rubecula hyrcanus* Hartert, I, 754.210. *Erithacus rubeculus caucasicus* But.*Erithacus rubeculus caucasicus* Buturlin, Orn. Monatsber., 1897, p. 9.*Erithacus rubeculus caucasicus* Hartert, I, 755.*Erythacus hyrcanus* Богдановъ, Пт. Кавк., 98; Рос-  
сиговъ, СВ. Кавк., 50; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 990; Цвѣт-  
ковъ, 97.*Erythacus rubeculus* typ. et var. *hyrcanus*  
Радде, Orn. Caucas., 197; Id., Talysch, 19.*Dandalus hyrcanus* Lorenz, Beitrag, 21; Вильконскій,  
Аджарія, 114.*Erythacus rubeculus caucasicus* Сатунинъ, Мате-  
риалы, 61.*Dandalus rubecula caucasica* London, Reise, 14.Обыкновенная гнѣздящаяся форма всего края Е. г. сау-  
casicus, но, по Hartert'у, встрѣчается въ „Арменіи“ (?) и Е. г.  
*hyrcanus*. Онъ самъ изслѣдовалъ одинъ экземпляръ „von  
Batum am Kaspischen Meere“ (sic!).*Irania* De Filippi 1865.211. *Irania gutturalis* Guérin. Соловей бѣлошейка.*Cossypha gutturalis* Guérin, Rev. Zool., 1843,  
p. 162.*Cossypha gutturalis* Радде, Orn. Caucas., 198; Id.,  
Talysch, 19.*Erithacus gutturalis* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 996.*Irania gutturalis* Hartert, I, 755.Радде предполагаетъ, что эта птица зимою залетаетъ  
въ Талышъ, а проф. Мензбиръ подтверждаетъ это предполо-  
женіе. Однако, никто ея не констатировалъ пока тамъ фак-  
тически.

## Fam. Accentoridae.

## Accentor Bechst. 1802.

212. *Accentor collaris caucasicus* Tsch. Горная завирушка.

*Accentor collaris caucasicus* Tschusi, Orn. Monatsber., 1902, p. 186.

*Accentor alpinus* Богдановъ, Пт. Кавк., 106; Радде, Orn. Caucas., 191; Id., Talysch, 18; Динникъ, Орн. набл., 347; Lorenz, Beitrag, 33; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 1047; Сатунинъ, Матеріалы, 66.

*Accentor collaris* Catal., 45.

*Prunella collaris caucasicus* Hartert, I, 764.

*Accentor collaris collaris* Біанки, Ежег. З. М., IX, 123.

В. Л. Біанки сомнѣвается въ правильности отдѣленія кавказскихъ завирушекъ въ особый подвидъ, но Hartert подтверждаетъ это отдѣленіе.

Альпійская область всего края.

*Spermolegus* Kaup 1829.213. *Spermolegus fulvescens ocularis* Radde. Завирушка Радде.

*Accentor ocularis* Radde, Orn. Caucas., 192, Таб. XIV (1884).

*Accentor fulvescens* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 1049; Catal., 146.

*Accentor ocularis* Radde, Talysch, 18; Сатунинъ, Матеріалы, 66.

*Prunella fulvescens ocularis* Hartert, I, 770.

*Spermolegus ocularis* Біанки, Ежег. З. М., IX, 132.

Пограничныя съ Персіей горы (Малый Араратъ, Талышинскія).

*Prunella* Vieill. 1816.214. *Prunella modularis modularis* L. Лѣсная завирушка.

*Motacilla modularis* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 184 (1758).

*Accentor modularis* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 1044.

*Prunella modularis modularis* Hartert, I, 772;  
Біанки, Ежег. З. М., IX, 148 и 154.

215. *Prunella modularis orientalis* Sharpe.

*Accentor orientalis* Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VII, p. 652 (1883).

*Accentor modularis orientalis* Мензбиръ, Пт. Росс., II, 1046.

*Prunella modularis orientalis* Hartert, I, 774;  
Біанки, Ежег. З. М., IX, 149 и 154.

*Accentor modularis* Богдановъ, Пт. Кавк., 106; Радде, Orn. Caucas., 191; Id., Talysch, 18; Россиковъ, Дол. Малки, 24; Динникъ, Орн. набл., 346; Catal., 145.

*Accentor orientalis* Lorenz, Beitrag, 32.

*Accentor modularis orientalis* Вильконскій, Аджарія, 109; Цвѣтковъ, 100; Сатунинъ, Матеріалы, 65; Кобылинъ, Матеріалы, 33; Loudon, Reise, 23.

Гнѣздящаяся (осѣдлая) форма всего края *A. m. orientalis*, но, вѣроятно, зимою бываетъ въ Предкавказьѣ и *A. m. modularis*.

Fam. Troglodytidae.

*Troglodytes* Vieill. 1807.

216. *Troglodytes troglodytes troglodytes* L. Крапивникъ.

*Motacilla Troglodytes* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 188 (1758).

*Troglodytes troglodytes troglodytes* Hartert, I, 778.

217. *Troglodytes troglodytes hyrcanus* Sar. & Loud.

*Troglodytes parvulus hyrcanus* Sarudny & Loudon, Orn. Monatsber., 1905, p. 107.

*Troglodytes talyschensis* Buturlin Бутурлинъ, Наша Охота, 1908.

*Troglodytes troglodytes hyrcanus* Hartert, I, 780.

*Troglodytes parvulus* Богдановъ, Пт. Кавк., 111; Радде, *Ornis Caucas.*, 216; Id., *Talysch*, 19; Россиковъ, Дол. Малки, 37; Динникъ, Орн. набл., 347; Lorenz, *Beitrag*, 35; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 789; Вильконскій, Аджарія, 102; *Catal.*, 145; Цвѣтковъ, 89; Сатунинъ, Матеріалы, 67.

*Anorthura troglodytes* Кобылинъ, Матеріалы, 33.

*Troglodytes troglodytes* Дерюгинъ, Чорохск. кр., 27.

*Troglodytes parvulus subsp.* Loudon, *Reise*, 21.

По Hartert'у, во всемъ край *T. t. hyrcanus*, но это весьма сомнительно. Гораздо вѣроятнѣе, что эта форма распространена только въ Талышѣ и прилежащихъ къ Каспійскому морю мѣстностяхъ. Въ остальныхъ же частяхъ края живетъ типичная форма.

### *Cinclus* Borkh 1797.

#### 218. *Cinclus cinclus caucasicus* Mad. Оляпка.

*Cinclus caucasicus* Madarasz, *Ann. Mus. Hung.*, I, p. 560 (1902).

*Cinclus aquaticus* Богдановъ, Пт. Кавк., 82; Динникъ, Орн. набл., 342; Россиковъ, СВ. Кавк., 54; Билькевичъ, Дагестанъ, 10.

*Cinclus aquaticus* typ. et varts: *melanogaster* et *cashmiriensis* Радде, *Ornis Caucas.*, 214; Id., *Talysch*, 19.

*Cinclus caschmiriensis* Lorenz, *Beitrag*, 34; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 1039; Вильконскій, Аджарія, 103; Цвѣтковъ, 98.

*Cinclus rufiventris* Дерюгинъ, Чорохск. кр., 26; Кобылинъ, Матеріалы, 33.

*Cinclus cinclus caucasicus* Сатунинъ, Матеріалы, 66; Hartert, I, 794.

*Cinclus aquaticus melanogaster* et *C. a. caschmiriensis* *Catal.*, 124 и 125.

Весь край, по горнымъ рѣчкамъ.

## Fam. Hirundinidae.

*Hirundo* L. 1758.219. *Hirundo rustica rustica* L. Деревенская ласточка.

*Hirundo rustica* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 191 (1758).

*Hirundo rustica* Богдановъ, Пт. Кавк., 115; Радде, Orn. Caucas., 227; Id., Talysch, 20; Динникъ, Орн. набл., 376; Lorenz, Beitrag, 41; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 686; Вильконскій, Аджарія, 119; Catal., 164; Цвѣтковъ, 86; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 29; Сатунинъ, Матеріалы, 69; Кобылинъ, Матеріалы, 32.

*Chelidon rustica rustica* Hartert, I, 800.

Весь край.

*Chelidon* Boie 1822.220. *Chelidon urbica urbica* L. Городская ласточка, воронѣкъ.

*Hirundo urbica* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 192 (1758).

*Chelidon urbica* Богдановъ, Пт. Кавк., 116; Радде, Orn. Caucas., 229; Id., Talysch, 20; Lorenz, Beitrag, 41; Билькевичъ, Дагестанъ, 13; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 674; Catal., 165; Цвѣтковъ, 85; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 27; Сатунинъ, Матеріалы, 70; Кобылинъ, Матеріалы, 31.

*Hirundo urbica* Вильконскій, Аджарія, 120.

*Hirundo urbica urbica* Hartert, I, 807.

Весь край.

*Riparia* Forst. 1817.221. *Riparia riparia riparia* L. Береговая ласточка.

*Hirundo riparia* Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 192 (1758).

*Cotyle riparia* Богдановъ, Пт. Кавк., 117; Радде, Orn. Caucas., 231; Id., Talysch, 20; Динникъ, Орн. набл., 376; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 679; Вильконскій, Аджарія, 120; Catal., 165; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 28; Сатунинъ, Матеріалы, 70; Кобылинъ, Матеріалы, 32.

*Riparia riparia riparia* Hartert, I, 811.

Весь край.

222. *Riparia rupestris* Scop. Горная ласточка.

*Hirundo rupestris* Scopoli, Annus I Historico-Nat., p. 165 (1769).

*Cotyle rupestris* Богдановъ, Пт. Кавк., 116; Раде, Orn. Caucas., 230; Id., Talysch, 20; Динникъ, Орн. набл., 375; Lorenz, Beitrag, 42; Билькевичъ, Дагестанъ, 13; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 683; Вильконскій, Аджарія, 120; Цвѣтковъ, 85.

*Hirundo rupestris* Catal., 165.

*Biblis rupestris* Дерюгинъ, Чорохск. кр., 28.

*Riparia rupestris* Hartert, I, 815.

Весь край.

### Дополненія.

*Garrulus glandarius anatoliae* Seeb.

*Garrulus atricapillus* subsp. *anatoliae* Seeböhm, Ibis, 1883, p. 7.

*Garrulus melanoscephalus* var. *anatoliae* Дерюгинъ, Чорохск. кр., 6; Нестеровъ, Матер. для орнитофауны Батумск. обл., Изв. Кавк. Муз., т. V, 113.

Слѣдуя Hartert'у и Бутурлину, я соединилъ эту форму съ *G. g. krynicki*. Въ только что напечатанной статьѣ П. В. Нестеровъ (I. с.) доказываетъ ея самостоятельность, что я и считаю необходимымъ отмѣтить безъ дальнѣйшихъ комментаріевъ.

Чорохскій край.

*Lanius senator niloticus* Bp.

*Enneostonus niloticus* Bonaparte, Rev. Zool., 1853, p. 439.

*Lanius senator niloticus* Hartert, I, p. 436; Бутурлинъ, Орнит. Вѣстн., 1911, 16.

По изслѣдованію С. А. Бутурлина, къ этой формѣ относится гнѣздящійся въ Закавказьѣ красноголовый сорокопутъ.

*Siphia parva colchica* Dombrowsky.

*Siphia parva colchica* Dombrowsky, Орнит. Вѣстн., 1911, 34.

Эта новая форма малой мухоловки описана изъ западнаго Закавказья. Возможно, что она распространена и во всемъ Закавказьѣ.

К. А. Сатунинъ.

Тифлисъ.

7 февраля 1911 г.

